دور الطاقة المايكروية في مكافحة ثلاثة انواع من حشرات الحبوب المخزونة

أياد يوسف إسماعيل

قسم علوم الحياة، كلية التربية، جامعة الموصل، الموصل، العراق

الخلاصة

استخدمت ثلاثة مستويات من الطاقة المايكروية واطئة، ومتوسطة، وعالية ٢٦٠ و ٥٢٠ و ٧٨٠ واط لمكافحة ثلاثة انواع من حشرات الحبوب المخزونة هي خنفساء الحبوب المنشارية *Oryzaephilus surinamensis* L. وخنفساء الطحين الحمراء *Tribolium castaneum* Herbst وخنفساء الخابرا *Trogoderma granarium* Evert، في منتجات الحبوب المخزونة هي الجريش والبرغل والحبية وبواقع ثلاثة مدد تعريض هي ١ و ١.٥ و ٢ دقيقة. أظهرت النتائج ان اعلى نسبة قتل كانت في خنفساء الحبوب المنشارية حيث بلغت كمعدلات ٧٥.٦٧٪ تلتها خنفساء الطحين الحمراء بنسبة قتل ٦٨.٦٤٪ ثم خنفساء الخابرا ٦٦.٢٩٪، اعطى المستوى العالي نسبة قتل بلغت ١٠٠٪ ثم المستوى المتوسط ٩٩.٦٣٪ واخيرا فان مستوى الطاقة الواطي اعطى نسبة ١٠.٩٨٪ فقط. بلغت نسبة القتل للحشرات اعلاها في البرغل ٧١.٤٨٪ في حين كانت اوطنها في الحبية ٦٧.٩٪ بشكل عام. اوقات التعريض ١ و ١.٥ و ٢ دقيقة اعطت نسبة القتل ٦٦.٧٩ و ٦٨.٦٤ و ٧٥.١٨٪ على التوالي. وظهر ان درجات الحرارة الناتجة عن التجربة متقاربة في المنتجات الثلاث وكانت ٧٢.٧٧ و ٧٣.٨٨ و ٦٩.٧٧°م بينما في المعاملة الضابطة كانت ٢٥.٣٣°م. بلغت درجات الحرارة لمستويات طاقة التعريض ٨٧.٠°م و ٦٢.٤١°م و ٣١.٨٣°م للمستوى العالي والمتوسط ثم الواطي على التوالي.

المقدمة

تتعرض منتجات الحبوب اثناء الخزن والتسويق الى الاصابة ببعض الافات الحشرية ومن اهم هذه الافات خنفساء الحبوب المنشارية *Oryzaephilus surinamensis* L. وخنفساء الطحين الحمراء *Tribolium castaneum* Herbst وخنفساء الخابرا *Trogoderma granarium* Evert. من منتجات الحبوب المخزونة الرئيسية البرغل وهو كسر حنطة خشنة مغلية في حين ان الجريش هو كسر حنطة خشنة غير مغلية واما الحبية فهي حبة حنطة خشنة مغلية و مقشورة فقط. ان استخدام الطاقة المايكروية يكون مفيدا جدا في مكافحة هذه الحشرات في منتجات الحنطة نظرا لخصوصية التعامل مع هذه المنتجات ولعدم وجود متبقيات لاستخدام الطاقة المايكروية Microwave Energy او ظهور صفة المقاومة لها من قبل الحشرات المعرضة لها وامكانية تعريض العبوات المختلفة من تلك المنتجات الى هذه الطاقة وان لهذه المنتجات مواصفات الجودة نفسها الموجودة في المنتجات غير المعاملة كما اشار الى ذلك Hertelendy و Pinter (١٩٨٥). ومن ناحية سلامة المنتجات المعرضة للاشعة المايكروية فقد ذكر Tang و Wang (٢٠٠١) ان طريقة مكافحة للحشرات باستخدام الطاقة المايكروية هي طريقة جذابة كمعاملة للحجر الزراعي Quarantine treatment بسبب انها سريعة وأمنة وكلفة اجراءها تقارب التبخير بالكمياويات وانها لا تؤثر على النوعية في الحنطة والحبوب عموما والجوز الامريكي والخشب وثمار البابايا Papaya المعاملة بها إلا انها تؤثر على نوعية جوز الهند والجبن وثمار الكرز والفواكه عموما. لذا فقد هدفت هذه الدراسة لاختبار مستويات من الطاقة المايكروية ولمدد تعريض مختلفة من اجل التوصل الى الطاقة الفعالة في مكافحة ايا من الحشرات الثلاثة ومقدار الزمن اللازم لذلك في منتجات الحبوب قيد الدراسة وللمرة الأولى في القطر .

مواد البحث وطرائقه

اختبرت في هذه الدراسة في مختبر الحشرات في كلية العلوم جامعة الموصل عام ٢٠٠٥-٢٠٠٦ على ثلاثة مستويات من الطاقة المايكروية وهي عالي ٧٨٠ واط ووسط ٥٢٠ واط واطي ٢٦٠ واط تم الحصول عليها من خلال فرن مايكرووي Microwave Oven وذلك حسب المواصفات الموجدة في

دليل تشغيل الجهاز المجهز من قبل الشركة المنتجة له، وبمدد تعريض ١ و ١.٥ و ٢ دقيقة. في ثلاثة من منتجات الحبوب المخزونة هي الجريش و البرغل والحبية. وضعت خمسة غرامات من كل من منتجات الحبوب المخزونة قيد الدراسة في قناني زجاجية سعة خمسة مل ثم وضعت فوقها عشرة افراد من الحشرات الكاملة لكل من خنفساء الحبوب المنشارية *Oryzaephilus surinamensis* L. وخنفساء الطحين الحمراء *Tribolium castaneum* Herbst وخنفساء الخابرا *Trogoderma granarium* Evert تم الحصول عليها من مزارع مرباة في البيئة الغذائية المكونة من جريش تحت درجة حرارة $30 \pm 1^\circ \text{C}$ ورطوبة نسبية $75 \pm 5\%$. أجريت التجربة بواقع ثلاث مكررات لكل نوع حشري عشرة حشرات ولكل مستوى من مستويات الطاقة المختبرة. حضنت القناني بعد المعاملة في الحاضنة أعلاه. قدرت النسبة المئوية للموت بعد ٢٤ ساعة من المعاملة ثم عدلت هذه النسب حسب معادلة Abbott (١٩٢٥).

تم قياس درجات حرارة منتجات الحبوب المخزونة المعرضة للطاقة المايكروية بالمستويات والمدد الخاصة بالتجربة بغرس محرار زئبقي في مادة التعريض بعد اخراجها من الفرن فوراً ، كما قيست ابعاد المنتجات والحشرات تحت المجهر بعدسة القياس الخاصة بذلك. استخدم في التجربة التصميم العشوائي الكامل ألعاملي واستخدمت الرزمة الإحصائية Spss لحساب تباين العوامل الخاصة بالتجربة واتبع اختبار دنكن للمتوسطات المتعددة لبيان المعنوية تحت مستوى ٥٪ (ابو علام، ٢٠٠٣).

النتائج والمناقشة

تظهر البيانات في الجدول (١) النسب المئوية المعدلة للقتل لثلاثة انواع من حشرات الحبوب المخزونة (خنفساء الحبوب المنشارية وخنفساء الطحين الحمراء وخنفساء الخابرا) اللاتي عرضو للطاقة المايكروية بمستوياتها الثلاثة الواطئة والمتوسطة والعالية في منتجات الحبوب المخزونة وبمدد تعريض ١ و ١.٥ و ٢ دقيقة. يلاحظ من النتائج وجود اختلاف معنوي واضح فيها فكانت اعلى نسبة مئوية للقتل في خنفساء الحبوب المنشارية ٧٥.٦٧ ٪ تلتها خنفساء الطحين الحمراء حيث بلغ ٦٨.٦٤ ٪ ثم خنفساء الخابرا وكان ٦٦.٢٢ ٪ وقد يعزى ذلك الى الاختلاف في حجم الحشرات مما يعني اختلاف في كمية المحتوى المائي الخاص بكل حشرة حيث ان من المعروف ان كفاءة الطاقة المايكروية تزداد برفعها لدرجة حرارة الجسم الحاوي على كمية اكبر من الماء فمن ملاحظة البيانات في الجدول (٢) نجد ان خنفساء الطحين الحمراء ذات حجم نسبي ضعف الحجم النسبي لخنفساء الحبوب المنشارية في حين ان الحجم النسبي لخنفساء الخابرا كان ثلاثة اضعاف الحجم النسبي لخنفساء الحبوب المنشارية ويبدو من الجدول ايضا ان لون الحشرة ليس له تأثير.

اما من حيث مستوى الطاقة المايكروية المستعمل فقد اظهر المستويان المتوسط والعالي تأثيرا معنوياً مقارباً في نسب القتل المئوية لحشرات التجربة اذ بلغ ٩٩.٦٣ و ١٠٠ ٪ لكل منها على التوالي في حين اعطى المستوى الواطئ نسبة قتل منخفضة بلغت ١٠.٩٨ ٪ لحشرات التجربة وهذا يتفق مع ما وجدته Hurlock وآخرون (١٩٧٩) من حصولهم على نسبة قتل ١٠٠ ٪ في كلا حشرتي خنفساء الحبوب المنشارية وخنفساء الطحين الحمراء عند طاقة ٧٨٠ واط.

اما بالنسبة لمدد التعريض ١ و ١.٥ و ٢ دقيقة فقد اظهرت تأثيراً معقولاً ومتدرجاً وبلغت نسب القتل ٦٦.٧٩ و ٦٨.٦٤ و ٧٥.١٨ ٪ لكل من خنفساء الحبوب المنشارية وخنفساء الطحين الحمراء وخنفساء الخابرا على التوالي وهذا يتماشى مع ما وجدته Hall (١٩٨١) من ان تعريض خنفساء الجلود متعددة الالوان *Trogoderma inclusum* لمدد ٧٥ و ٩٥ و ١٢٠ ثانية في فرن الأشعة المايكروية كانت كافية لقتل ١٠٠ ٪ من هذه الحشرة في نماذج المعشب بسمك ٥ و ٩ و ١٥ سم على التوالي .

تبين النتائج في الجدول (٣) نسب القتل المئوية المعدلة في حشرات التجربة في الجريش ، البرغل والحبية بمدد التعريض المختلفة.

اوضحت النتائج ان الحشرات المرباة على البرغل اعطت اعلى نسبة قتل مئوية لحشرات التجربة بلغت ٧١.٤٨ ٪ تلاها في ذلك الجريش ٧١.٢٣ ٪ واخيرا الحبية ٦٧.٩ ٪. ومن ملاحظة نتائج الجدول (٤) تبين ان السبب قد يعود الى معدل درجة الحرارة الخاصة بكل منتج بعد التعريض للطاقة المايكروية بمستوياتها الثلاثة ومدد التعريض الثلاثة ايضا، فقد بلغ معدل اعلى درجة حرارة في البرغل في المسنوى العالي من الطاقة المايكروية ١١٢.٦٦ °م واختلفت بذلك عن الجريش والحبية ١٠٥.٦٦ و

١٠٤.٦٦ م على التوالي في حين كانت في المعاملة الضابطة ٢٥.٣٣ م فقط ، اما في المستوى الواطئ والمتوسط من الطاقة المايكروية فان درجات الحرارة في الجريش ، البرغل والحبية تماثلت في المعنوية فيما بينها فبلغت ٣٢.٦٦ و ٣٥.٦٦ و ٣٣.٦٦ و ٧١.٠ و ٧٣.٣٣ و ٨٠.٠ م على التوالي ولكنها اختلفت عن المعاملة الضابطة البالغة ٢٥.٣٣ م.

الجدول (١) : النسبة المئوية المعدلة للقتل لثلاثة حشرات مخزنية معرضة للطاقة المايكروية في منتجات الحبوب المخزونة المحلية بمدد تعريض مختلفة.

مستويات الطاقة المايكروية	مدة التعريض دقيقة	نوع الحشرة			معدل مستوى الطاقة	معدل مدد التعريض بالدقيقة
		المنشارية	الحمراء	الخابرا		
واطنة ٢٦٠ واط	١ ١.٥ ٢	٤.٤ ١٦.٦ ٦٠.٠	٠.٠ ١.١ ١٦.٦	٠.٠ ٠.٠ ٠.٠	١٠.٩٨ * ب	١ ١.٥ ٢
متوسطة ٥٢٠ واط	١ ١.٥ ٢	١٠٠ ١٠٠ ١٠٠	١٠٠ ١٠٠ ١٠٠	٩٦.٠ ١٠٠ ١٠٠	٩٩.٦٣ أ	
عالية ٧٨٠ واط	١ ١.٥ ٢	١٠٠ ١٠٠ ١٠٠	١٠٠ ١٠٠ ١٠٠	١٠٠ ١٠٠ ١٠٠	١٠٠ أ	
معدل نسب القتل للحشرات		١٧٥.٦٧ أ	٦٨.٦٤ ب	٦٦.٢٩ ج		

* الارقام ذات الحروف المتشابهة لا تختلف معنويا حسب اختبار دنكن المتعدد بمستوى ٥٪.

الجدول (٢) : الاطوال المختلفة لحشرات التجربة بالملمتر (قبل التجربة).

نوع الحشرة	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم ملم ٣	الحجم النسبي	اللون
المنشارية	٣.٠	٠.٨	٠.٥٤	١.٢٩٦	١.٠٠	قهوائي غامق
الحمراء	٣.٥	١.٢	٠.٦٣	٢.٦٤٦	٢.٠٤	قهوائي محمر
الخابرا *	٢.٥	٢.٢	٠.٠٧	٣.٨٥٠	٢.٩٧	قهوائي محمر الى اسود

* معدل قياسات الذكر والأنثى.

الجدول (٣) : معدلات عدد الأفراد الميتة لحشرات الدراسة المعرضة للطاقة المايكروية في ثلاثة من منتجات الحبوب المخزونة.

مستويات الطاقة المايكروية	الزمن بالدقيقة	منتجات الحبوب المخزونة		
		جريش	برغل	حبية
واطنة ٢٦٠ واط	١	٤.٤	٠.٠	٠.٠
	١.٥	١٥.٥	٠.٠	٠.٠
	٢	٢١.١	٤٣.٣	١٢.٢
متوسطة ٥٢٠ واط	١	١٠٠	١٠٠	٩٦.٠
	١.٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠
عالية ٧٨٠ واط	١	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	١.٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٢.٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
معدل نسب القتل للحشرات		٧١.٢٣٥ ب	٧١.٤٨١ أ	٦٧.٩٠١ ج *

* الأرقام ذات الحروف المتشابهة لا تختلف معنويا حسب اختبار دنكن المتعدد بمستوى ٥٪.

الجدول (٤) : درجات الحرارة المثوية لمنتجات الحبوب المخزونة المحلية المعرضة للطاقة المايكروية في مدد مختلفة.

المعدل **	منتجات الحبوب المخزونة			المعاملة	الزمن	مستويات الطاقة
	حبية	برغل	جريش	الصابطة	بالدقيقة	الميكروية
٣١.٨٣ ج	٢٨	٣٠	٢٨	٢٥	١.٠	واطئة ٢٦٠ واط
	٣٥	٣٤	٣٣	٢٥	١.٥	
	٣٨	٤٣	٣٧	٢٦	٢.٠	
٦٢.٤١ ب	٦٢	٥٥	٥٥	٢٥	١.٠	متوسطة ٥٢٠ واط
	٧٨	٧٥	٧٣	٢٦	١.٥	
	١٠٠	٩٠	٨٥	٢٥	٢.٠	
٨٧.٠٨ أ	٩٠	١٠٤	٩٦	٢٥	١.٠	عالية ٧٨٠ واط
	١٠٨	١١٤	١٠٦	٢٦	١.٥	
	١١٦	١٢٠	١١٥	٢٥	٢.٠	
	١٠٤.٦ ب	١١٢.٦ أ	١٠٥.٦٦ ب	٢٥.٣٣ *	المعدل	
	٧٢.٧٧ أ	٧٣.٨٨ أ	٦٩.٧٧ أ	٢٥.٣٣ ج		معدل نسب القتل للحشرات

* الأرقام ذات الحروف المتشابهة لا تختلف معنويا حسب اختبار دنكن المتعدد بمستوى ٥ %
 ** الملاحظة نفسها اعلاه عاموديا.

اما معدل درجات الحرارة لمنتجات الحبوب المخزونة في المستويات الثلاثة الواطئ والمتوسط والعالي من الطاقة المايكروية فكانت متدرجة ومقبولة وهي ٣١.٨٣ و ٦٢.٤١ و ٨٧.٠٨ م التوالي وهو يتفق مع ما ذكره Watters (١٩٧٦) من ان معاملة خنفساء الطحين الحمراء بطاقة ٣٠ واط وتردد ٨.٥ كيكاهرتز اعطى نسبة قتل ١٠٠٪ عند درجة حرارة ٦٠ م وكانت نسبة القتل في الحنطة اكثر مما في الطحين. مما سبق يتبين ان ليس لاحجام منتجات الحبوب المخزونة او الوانها أي رابط مع نسبة القتل المثوية لحشرات التجربة (جدول ٥) الا ان طبيعة المنتج قد يكون له دور في رفع درجة حرارته، وهو ما يتفق مع ما وجدته اسماعيل (١٩٩٨) من ان تأثير الاشعة المايكروية على الحشرات الكاملة لخنفساء الطحين الحمراء في الحنطة والشعير والطحين سببت في نسبة قتل مثوية بلغت ٩٠ و ١٠٠ و ١٠٠٪ على التوالي ولمدة تعريض امدها دقيقتين، وفي خنفساء الخابرا كان التأثير واضحا وبشكل معنوي في معاملات ٠.٥ و ١ و ٢ دقيقة في الحنطة والشعير اذ بلغت ٤٦.٦ ، ٥٦.٦ ، ١٠٠ و ٤٠ ، ٥٠ ، ١٠٠٪ على التوالي ، اما في الطحين فان مدة التعريض ١ و ٢ دقيقة اعطينا نسبة قتل معنوية بلغت ٤٠ و ١٠٠٪ وهو نفس ما لاحظته Fields (١٩٩٢) من ان الفحوص باستخدام الطاقة المايكروية بقوة تعريض (٣٠٠-٣٠٠٠) ميكاهرتز فظهر ان هنالك مجموعتين من الحشرات الاولى قتلت بين ٤١ - ٤٧ م وهي خنفساء الحبوب المنشارية وسوستي الحنطة والرز *Sitophilus* حشرات *granarius & Sitophilus oryzae* والمجموعة الاخرى قتلت بين ٤٨ - ٥٧ م وهي *Trogoderma labrum*, *T. parabile*, *L. serricorne* & *Tenebroides mauritanicus*.

الجدول (٥) : الأطوال المختلفة بالمليمتر لمنتجات الحبوب المخزونة المحلية.

منتجات الحبوب المخزونة المحلية وألوانها			أطوال الجزيئات
حبية (اصفر)	برغل (قهوائي)	جريش (اصفر فاقع)	
٦.٠ أ	٣.٣٣ ب	١.٧٣ ج	الطول
٣.٠ أ	٢.٢٦ ب	١.٢٥ ج	العرض

* الأرقام ذات الحروف المتشابهة لا تختلف معنوية حسب اختبار دنكن المتعدد بمستوى ٥ % اقنيا.

ROLE OF MICROWAVE ENERGY TO CONTROL THREE SPECIES OF STORE PRODUCTS INSECTS

Aead Y. Ismail

Biology Dept. ,Education College ,Mosul University, Mosul-IRAQ

ABSTRACT

Three levels of microwave energy low ,medium& ,high. 260,520 and 780 w, respectively were used to control three species of the saw-toothed grain beetle *Oryzaephilus surinamensis* L.,Red flour beetle *Tribolium castaneum* Herbst,the Khapra beetle *Trogoderma granarium* Evert in Store Products ,viz. Jrush ,Burglar and Habia at three exposure periods 1,1.5 and 2 minutes. The results showed that the highest mortality percentage occupied in *Oryzaephilus surinamensis* 75.67%,followed by *Tribolium castaneum* which was 68.64% while the lower was 66.29% in case of *Trogoderma granarium*. Highest energy level gave 100% mortality percentage ,while the medium level gave 99.63% percentage whereas only 10.98% percentage was recorded with low level.The highest percent mortality in Burglar 71.48% while the lower was in Habia 67.9%. Exposure periods of 1.0,1.5 and 2 minutes gave 75.18 , 68.64 and 66.79% mortality percentage, respectively . The temperature produced was almost similar in three products ; 69.77 ,73.88 and 72.77 °C while that of control treatment was 25.33°C.The temperature of microwave energy level were 87.08, 62.41 and 31.83°C for high ,medium and low, respectively .

المصادر

- اسماعيل، اياد يوسف (١٩٩٨). استخدام مجلات الاشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة لمكافحة حشري خنفساء الطحين الحمراء *Tribolium castaneum* و خنفساء الخابرا *Trogoderma granarium* Evert، اطروحة دكتوراة، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، ص ٩٠.
- ابو علام، رجاء محمود (٢٠٠٣). التحليل الاحصائي للبيانات باستخدام برنامج Spss، دار النشر للجامعات بمصر، ص ٣٨٠.
- Abbott, W.S.(1925). A method of computing the effectiveness of insecticide. J. Econ. Entomol, 18: 265 - 267.
- Fields, P.(1992).The control of stored products insect and mites with extreme temperatures.J. Stored Prod.Res.,28:89-118.
- Hall, D. W. (1981). Microwave: A method to control herbarium insects.TAXON,30(4)818-19.
- Hurlock ,E.T.;B.E.Liewelling and L.M.Stables(1979). Microwave can kill insect pests. Hygiene and Maintenance Food Manufacture.4:38-9.
- Hertelendy,L.and A. Pinter, (1985). Microwave control techique for granary pests.Zala megyi Novenyvedelmi es Agrokemiai Allomas, Zalaegerszeg, Hungary Novenyvedelem 21:5,215.
- Nakakita, H. O. Imura; H. Nabetani; A. Watanable; S. Watanable and S. Chikubu (1989). Application of electromagnetic wave for control of stored products insect. I. Effects of Microwave on susceptibilites of insects and quality of rice.J.Jap.Soc.Food Sci.Tech.36:267-73.
- Wang, S. and J. Tang (2001). Radio frequency and microwave Alternative treatment for insect control in nuts:A review.Agri.Engineer.J.10(3&4):105- 120.
- Watters, FL.(1976). Microwave radiation for control of *Tribolium confusum* in wheat and flour. J. Stored Prod.Res.12(1):19-25.