استجابة نمو وحاصل صنفين من القطن للكثافة النباتية ومواعيد اضافة السماد النتروجيني

ياسين عيسى حسين اللهبي
الشركة العامة لتجارة الحبوب
السيطرة النوعية

صالح محمد ابراهيم الجبوري
كلية الزراعة والغابات
جامعة الموصل

الخلاصة

أجريت هذه الدراسة لمعرفة استجابة صنفين من القطن هما لاشاتا وكوكر ٣١٠ ومسافتين زراعة بين النباتات ٢٠ و ٣٠ سم وثلاثة مواعيد لاضافة السماد النتروجيني (الموعد الاول نصف الكمية عند الزراعة والنصف الاخر عند مرحلة تكوين الجوز ، والموعد الثاني نصف الكمية عند الزراعة ونصف الكمية بعد شهر من الزراعة ، والموعد الثالث ربع الكمية عند الزراعة ونصف الكمية بعد شهر من الزراعة وربع الكمية عند مرحلة تكوين الجوز) في صفات النمو والحاصل ومكوناته. تضمنت الدراسة تجربة حقلية خلال الموسم الصيفي لعام ٢٠٠٥، نفذت التجربة في قضاء الشرقاط الذي يبعد حوالي ١٥٠ كم شمال مدينة تكريت، باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة RCB وبتلات مكررات . ويمكن تلخيص النتائج بتفوق الصنف كوكر ٣١٠ معنوياً على الصنف لاشاتا في صفة ارتفاع النبات بينما تفوق الصنف لاشاتا معنوياً في صفة وزن الجوزة. تفوقت مسافة الزراعة ٣٠ سم بين النباتات معنوياً على مسافة الزراعة ٢٠ سم في صفة ارتفاع النبات وعدد الافرع الخضرية/ نبات وعدد الافرع الثمرية/ نبات وعدد الجوز الكلي /نبات معنوياً عند الزراعة بمسافة ٣٠ سم بين النباتات. تفوقت صفة ارتفاع النبات معنوياً عند اضافة السماد النتروجيني في الموعد الاول بينما تفوقت صفة حاصل القطن الزهر وحاصل القطن الشعر معنوياً عند الموعد الثالث.

المقدمة

يعد القطن من محاصيل الألياف المهمة عالمياً من حيث المساحة المزروعة والانتاج وتنوع الاستعمالات ويحتل مركزاً هاماً في التجارة العالمية . ولا يقتصر العمل في مجال الزراعة فقط بل يتعداه الى العمل في المحالج ومعامل الغزل والنسيج والصناعات الاخرى والتسويق . ومن المعروف أن استعمالات القطن الاساسية تعتمد على أليافه التي تشكل نسبة ٣٥% من الحاصل في صناعة الغزل والنسيج ، وتحتوي بذور القطن على نسبة من الزيت تقدر بحوالي ٢٠-٢٧% يستفاد منها في صناعة الزيت والصابون واستعمالات عديدة اخرى ويبقى بعد عصر بذور القطن لاستخراج الزيت كسبة القطن التي تستعمل كعلف مركز للحيوانات المختلفة اذ تحتوي على ٤٠% من وزنها مواد بروتينية (الغزال ، ١٩٩٤) . إن الاتجاه الحديث لزيادة الحاصل في وحدة المساحة بالاضافة الى انتخاب الصنف الملائم للمنطقة التي يتم الزراعة فيها هو زيادة الكثافة النباتية . فالارتفاع الحاصل في تكاليف الانتاج، دفعت المزارعين إلى زيادة الكثافة النباتية لرفع صافي الربح من زراعة محصول القطن . فضلاً عن ذلك فإن زيادة الكثافة النباتية تؤدي الى الغلق المبكر للمسافات بين النباتات وهذا له فائدة في اعتراض الضوء وزيادة الضوء المنتشر ويقلل من منافسة الادغال ويساعد ايضا على التقليل من تبخر الماء (Kreig ، ١٩٩٦). ومن العوامل الاخرى التي تساعد في زيادة إنتاجية وحدة المساحة هي الاستخدام المتوازن للاسمدة الكيماوية ومنها النتروجينية . فالنتروجين من العناصر الغذائية الضرورية لنمو المحصول وله دور رئيسي في تكوين الكلوروفيل والاحماض النووية، ويتسبب عن نقصه اصفرار النباتات او تلونه بلون اخضر باهت وذبوله وصغر حجمه كما يؤدي نقص العناصر الغذائية وبضمنها النتروجين إلى عدم اكتمال ترسيب السليولوز في طبقات الجدار الثانوي (عبد السلام ، ١٩٨٠). ان من ابرز مشكلات استخدام السماد النتروجيني تعرضه إلى الفقدان عند اضافته الى التربة بسبب الغسل وتطاير الامونيا أو التثبيت (حسن وآخرون ، ١٩٩٠). ان طول موسم نمو القطن الذي يمتد من بداية نيسان الى نهاية تشرين الثاني وحاجته الى كميات كبيرة من المياه لغرض نموه بشكل جيد ودرجات الحرارة العالية في موسم الصيف ، تعد عوامل تؤدي الى فقدان النتروجين ولهذا السبب يعطى السماد النتروجيني على دفعات لكي يبقى عنصر النتروجين متوفراً للنبات عند كل مرحلة من مراحل النمو .

مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني .

تاريخ تسلم البحث ٢٠٠٨ / ١ / ١٦ وقبوله ٢٠٠٨ / ٣ / ٦

ويتوقف موعد إضافة الأسمدة النيتروجينية على الظروف المناخية ونوع وكمية السماد وعلى الخواص البيولوجية للنباتات المسمدة وكذلك احتياجات هذه النباتات للعناصر الغذائية في مراحل نموها المختلفة . فالقطن يحتاج في بداية حياته إلى تأمين ظروف غذائية جيدة لأن الأعضاء تتشكل أو تتكشف في هذه الفترة (الفارس ، ١٩٩٠) . إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى استجابة صنف القطن لاشاتا وكوكر ٣١٠ للكثافة النباتية ومواعيد إضافة مختلفة من السماد النيتروجيني.

مواد البحث وطرقه

أجريت هذه الدراسة خلال الموسم الزراعي الصيفي لعام ٢٠٠٥ وتضمنت تجربة حقلية نفذت في قضاء الشرقاط الواقع على بعد (١٥٠ كم) شمال مدينة تكريت، استخدم فيها صنفين من القطن لاشاتا وكوكر ٣١٠، ومسافتين للزراعة بين النباتات ٢٠ و ٣٠ سم ، وثلاثة مواعيد لإضافة السماد النيتروجيني (الموعد الأول نصف الكمية عند الزراعة + نصف الكمية عند مرحلة تكوين الجوز ، والموعد الثاني نصف الكمية عند الزراعة + نصف الكمية بعد شهر من الزراعة ، والموعد الثالث ربع الكمية عند الزراعة + نصف الكمية بعد شهر من الزراعة + ربع الكمية عند مرحلة تكوين الجوز). إذ استخدم سماد اليوريا (٤٦ % N) كمصدر للسماد النيتروجيني وبمعدل ٦٠ كغم/دوم، طبقت التجربة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة (RCBD) وبثلاثة تكرارات وفي كل مكرر (١٢) معاملة ناتجة من التوافق بين صنفين من القطن ومسافتين زراعة وثلاثة مواعيد لإضافة السماد النيتروجيني . احتوت الوحدة التجريبية على (٤ مروز) بطول (٥ م) وبمسافة (٧٠ سم) بين مرز وآخر. ووزعت المعاملات على الوحدات التجريبية بصورة عشوائية حيث تم فصل الوحدات التجريبية عن بعضها البعض بمسافة (١ م) . حرثت أرض التجربة بالمحراث المطرحي القلاب ، ثم أجريت عمليات التسوية والتنعيم وتمت الزراعة بتاريخ ١٦/٤ / ٢٠٠٥ ، أضيف السماد الفوسفاتي دفعة واحدة مع الموعد الأول لإضافة السماد النيتروجيني بمعدل ٣٠ كغم P2O5 / دوم، وقد تم إجراء كافة العمليات الزراعية من سقي وخف وترقيع ومكافحة ادغال وحشرات وحسب متطلبات التجربة.

الصفات المدروسة :

صفات النمو : تم دراسة صفات النمو عند النضج من خلال أخذ عينة مكونة من عشرة نباتات اختيرت عشوائيا من المرزتين الوسطيين لكل وحدة تجريبية وكانت الصفات المدروسة كالآتي :

- ١- ارتفاع النبات (سم) : تم قياسه من قاعدة النبات حتى أعلى نقطة من الساق الرئيسي.
- ٢- عدد الأفرع الخضرية / نبات .
- ٣- عدد الأفرع الثمرية / نبات .
- صفات الحاصل ومكوناته :
- ١- عدد الجوز الكلي / نبات .
- ٢- وزن الجوزة (غم) .
- ٣- دليل البذرة (غم) : عبارة عن وزن ١٠٠ بذرة بالغرام وأستخرج عن طريق حساب متوسط ١٠٠ بذرة أخذت من كل وحدة تجريبية بعد الحليج .
- ٤- دليل التيلة (غم/مئة بذرة) : وأستخرج من المعادلة التالية (Harrison و Christidis ، ١٩٥٥).

دليل البذرة x تصافي الحليج

_____ = دليل التيلة

١٠٠ - تصافي الحليج

- ٥- حاصل القطن الزهر (كغم / دوم) : تم تقديره من جمع حاصل القطن الزهر للمرزتين الوسطيين لحاصل الجنيتين الأولى والثانية حيث أخذت الجنية الأولى في ١٨/ أيلول/ ٢٠٠٥ والجنية الثانية في ٢٠/ تشرين أول/ ٢٠٠٥ وتم تحويل الحاصل إلى مساحة دوم واحد .

٦- **حاصل القطن الشعر (كغم / دونم)** : وتم تقديره من حاصل ضرب حاصل القطن الزهر من المرزبين الوسطيين $\times$ تصافي الحليج.

٧- **تصافي الحليج %** : وتم تقديرها من المعادلة التالية (عبد علي والأنصاري ، ١٩٨٠)

وزن القطن الشعر في العينة

$$\% \text{ لتصافي الحليج} = \frac{\text{وزن القطن الزهر في العينة}}{100 \times}$$

وزن القطن الزهر في العينة

تم تحليل البيانات للصفات المدروسة بالاستعانة ببرنامج (Statistical Analysis System) على الحاسوب وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة RCBD ، الراوي وخلف الله (٢٠٠٠)، وتمت المقارنة بين المتوسطات باستعمال اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال ٥%.

النتائج والمناقشة

تأثير التراكيب الوراثية :

صفات النمو :

ارتفاع النبات (سم) : تشير النتائج الواردة في جدول (١) إلى وجود اختلاف معنوي بين الصنفين لاشاتا وكوكر ٣١٠ في صفة ارتفاع النبات. أذ تفوق الصنف كوكر ٣١٠ بأعطائه أعلى ارتفاع للنبات بلغ ٧٤ ١٣٨ سم بنسبة زيادة ٥.٣٩٥ % عن الصنف لاشاتا الذي أعطى ارتفاعا قدره ٥٨٨ ١٣١ سم وربما يعود السبب الى اختلاف التراكيب الوراثية في عدد السلاميات على الساق الرئيسي. وهذا ما أشار إليه Nichols وآخرون (٢٠٠٤) إلى وجود اختلاف بين أصناف القطن في صفة ارتفاع النبات

عدد الأفرع الخضرية /نبات : تشير نتائج الجدول (١) إلى وجود فروق بين صنفين القطن لاشاتا وكوكر ٣١٠ في صفة عدد الأفرع الخضرية /نبات ألا ان هذه الفروقات لم تصل إلى حد المعنوية ، إذ أعطى الصنف لاشاتا عدد من الأفرع الخضرية بلغ ٩٢ ١ فرع خضري في حين اعطى الصنف كوكر ٣١٠ معدل للأفرع الخضرية بلغ ٨٣ ٢ فرع خضري. وهذه النتيجة تتفق مع ما وجدته الحمداني (٢٠٠٢) الذي أشار إلى اختلاف في عدد الأفرع الخضرية /نبات باختلاف الأصناف .

عدد الأفرع الثمرية /نبات : يبين الجدول (١) وجود فروق لصفة عدد الأفرع الثمرية /نبات بين صنفين القطن لاشاتا وكوكر ٣١٠ ألا ان هذه الفروقات لم تصل إلى حد المعنوية ، إذ بلغ عدد الأفرع الثمرية /نبات للصنف كوكر ٣١٠ ١٥.٣٤٤ فرع ثمري في حين بلغ عدد الأفرع الثمرية /نبات للصنف لاشاتا ١٤ ٠.٦٧ فرع ثمري.

الحاصل ومكوناته :

عدد الجوز الكلي /نبات : اشارت النتائج الواردة في الجدول (١) أن هناك اختلافاً بين صنفين القطن لاشاتا وكوكر ٣١٠ في صفة عدد الجوز الكلي /نبات الا ان هذا الاختلاف لم يصل الى حد المعنوية ، وقد اعطى الصنف كوكر ٣١٠ أعلى معدل للصفة بلغ ٥٢ ٣٢ جوزة في حين اعطى الصنف لاشاتا أقل معدل للصفة بلغ ٢٩.٦٩٤ جوزة . وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه داؤد وعلي (١٩٩٩).

وزن الجوزة (غم) : يتضح من نتائج الجدول (١) أن هناك اختلاف معنوي بين صنفين القطن لاشاتا وكوكر ٣١٠ في صفة وزن الجوزة ، إذ تفوق الصنف لاشاتا وأعطى أعلى معدل للصفة بلغ ٤.٤١٥ غم بنسبة زيادة ٦.٦١٦ % عن الصنف كوكر ٣١٠ الذي أعطى أقل معدل بلغ ٤.١٤١ غم. وقد يعود السبب إلى علاقة وزن الجوزة بصفة عدد الجوز/نبات وارتفاع النبات والتي تكون عكسية أحيانا .وهذه تتفق مع ما وجدته النداوي (١٩٩٧) الذي أشار إلى وجود اختلاف بين التراكيب الوراثية في صفة وزن الجوزة (غم).

دليل البذرة (غم) : تشير نتائج الجدول (١) عدم وجود اختلاف معنوي بين صنفين القطن لاشاتا وكوكر ٣١٠ ، حيث أعطى الصنف لاشاتا معدل للصفة بلغ ١١.١٦١ غم في حين أعطى الصنف كوكر ٣١٠ معدل للصفة بلغ ١٠.٧٨٩ غم .

دليل التيلة (غم/مئة بذرة) : يلاحظ من نتائج الجدول (١) عدم وجود اختلاف معنوي بين صنفين القطن لاشاتا وكوكر ٣١٠ في صفة دليل التيلة. حيث أعطى الصنف لاشاتا معدل للصفة بلغ ٠.٠٢ ٦ غم في حين أعطى الصنف كوكر ٣١٠ معدل للصفة بلغ ٥.٧٦٢ غم. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل

إليه خير (٢٠٠٠). الذي أشار إلى عدم وجود أختلاف في صفة دليل التيلة تحت تأثير التراكيب الوراثية .

حاصل القطن الزهر (كغم/دونم) : تبين النتائج الواردة في الجدول (١) أن هناك اختلافاً بين صنفين القطن

لاشأتا وكوكر ٣١٠ في صفة حاصل القطن الكلي الا ان هذا الاختلاف لم يصل الى حد المعنوية ، إذ أعطى الصنف كوكر ٣١٠ أعلى معدل للصفة بلغ ٥٣ ٧٩٣ كغم/دونم بينما أعطى الصنف لاشأتا أقل معدل للصفة بلغ ٨٢ ٧٨٨ كغم/دونم. وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصل اليه Akhtar وآخرون (٢٠٠٢) الذين أشاروا إلى وجود اختلاف في حاصل القطن الكلي تحت تأثير الأصناف .

حاصل القطن الشعر (كغم/دونم) : تشير نتائج الجدول (١) إلى ان صفة حاصل القطن الشعر سلكت سلوكا مشابها لصفة حاصل القطن الزهر ، إذ أعطى الصنف كوكر ٣١٠ معدل للصفة بلغ ٤ ٢٧٤ كغم/دونم في حين أعطى الصنف لاشأتا معدلا للصفة بلغ ٥٣ ٢٧٣ كغم/دونم. وقد يعود سبب ذلك الى علاقة هذه الصفة بصفة حاصل القطن الزهر .

تصافي الحليج % توضح النتائج الواردة في الجدول (١) أنه لم تكن هناك اختلافات معنوية بين صنفين القطن لاشأتا وكوكر ٣١٠. حيث بلغت نسبة تصافي الحليج ٣٤.٦٦٦ % لكلا الصنفين. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه كل من الباحثين جاسم وثاني (٢٠٠٥) .

الكثافة النباتية :

صفات النمو :

ارتفاع النبات (سم) : تبين النتائج الموضحة في الجدول (٢) أن هناك فروق معنوية بين مسافات الزراعة لصفة ارتفاع النبات ، إذ تفوقت المسافة ٣٠ سم وأعطت أعلى معدل للصفة بلغ ١٣٩.٤٩٣ سم بنسبة زيادة ٦١ ٦ % عن المسافة ٢٠ سم التي أعطت أقل معدل للصفة بلغ ١٣٠.٨٣٩ سم . ويمكن أن يعزى السبب في ذلك إلى انه عند المسافات الواسعة يكون هناك حيز مناسب لنمو النبات وتقل درجة المنافسة على العناصر الغذائية وبالتالي يزداد مقدار المواد الغذائية المصنعة ويؤدي ذلك إلى زيادة عدد العقد على الساق الرئيسي نتيجة زيادة انقسام الخلايا وتوسعها وبالتالي زيادة ارتفاع النبات وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه Clawson وآخرون (٢٠٠٦) .

عدد الأفرع الخضرية /نبات : تشير نتائج الجدول (٢) إلى وجود فروق معنوية بين مسافات الزراعة لصفة عدد الأفرع الخضرية/نبات ، إذ أعطت المسافة ٣٠ سم بين النباتات أعلى معدل للصفة بلغ ٦٠٦ ٢ فرع خضري بنسبة زيادة بلغت ٧٧ ٤٤ % عن المسافة ٢٠ سم والتي أعطت أقل معدل للصفة بلغ ٨٠ ١ فرع خضري . وقد يعزى السبب إلى توفر العناصر الغذائية والرطوبة والإضاءة الكافية عند الزراعة على مسافات واسعة والتي تشجع على تكوين التفرعات . وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه الحمداني (٢٠٠٢) .

عدد الأفرع الثمرية / نبات : توضح النتائج الموجودة في الجدول (٢) أن هناك اختلافاً معنوياً بين مسافات الزراعة لصفة عدد الأفرع الثمرية /نبات ، إذ يلاحظ تفوق المسافة ٣٠ سم معنوياً والتي أعطت أعلى معدل للصفة بلغ ١٦.٥٠٠ فرع ثمري بنسبة زيادة ٥٥ ٢٠ % عن المسافة ٢٠ سم التي أعطت أقل معدل للصفة بلغ ١٢.٩١١ فرع ثمري . وقد يعود سبب ذلك إلى زيادة حجم النبات بزيادة المسافة بين النباتات وزيادة ارتفاع النبات وزيادة عدد العقد على الساق الرئيسي نتيجة توفر الحيز المناسب للنمو وقلة المنافسة وهذا بدوره يشجع على تكوين أفرع ثمرية أكثر مقارنة مع النباتات المزروعة على مسافات ضيقة.

الحاصل ومكوناته :

عدد الجوز الكلي /نبات : تشير النتائج المبينة في الجدول (٢) إلى وجود اختلاف معنوي بين مسافات الزراعة في صفة عدد الجوز الكلي /نبات ، إذ تفوقت المسافة ٣٠ سم معنوياً وأعطت أعلى معدل للصفة بلغ ٣٧.٢٨٩ جوزة بنسبة زيادة بلغت ٥٥ ٤٩ % عن المسافة ٢٠ سم التي أعطت أقل معدل للصفة بلغ ٢٤.٩٣٣ . وقد يعزى سبب ذلك إلى علاقة عدد الجوز/نبات بصفة عدد الأفرع الثمرية/نبات حيث أعطت المسافة ٣٠ سم أعلى عدد للأفرع الثمرية جدول (٢) وربما كذلك إلى صفة ارتفاع النبات ، حيث أن زراعة النباتات على مسافات واسعة يعطي النبات حيزا اكبر فيؤدي إلى قلة المنافسة على العناصر الغذائية والضوء فيكون حجم النبات اكبر وعدد الأفرع الثمرية يكون اكبر وبالتالي ينعكس وذلك على عدد الجوز/نبات .

وزن الجوزة (غم): توضح البيانات الواردة في الجدول (٢) عدم وجود اختلاف بين مسافات الزراعة في صفة وزن الجوزة وقد بلغ معدل هذه الصفة ٣٩ و ٤ و ٨٨ غم للمسافات ٢٠ و ٣٠ سم على الترتيب.

دليل البذرة (غم) : تبين النتائج الموضحة في الجدول (٢) عدم وجود اختلاف بين مسافات الزراعة لصفة دليل البذور ، إذ بلغ معدل هذه الصفة ٨٦٧.١٠ و ٨٣ و ١١ غم والمسافات ٢٠ و ٣٠ سم على الترتيب، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه والحمداني (٢٠٠٢) ، والذي أشار إلى عدم وجود اختلاف معنوي بين مسافات الزراعة لصفة دليل البذرة .

دليل التيلة (غم شعر/مائة بذرة) :يشير الجدول (٢) عدم وجود اختلاف معنوي بين مسافات الزراعة في صفة دليل التيلة ، إذ بلغ معدل هذه الصفة ٥.٨٣٥ و ١٩٩ غم. وللمسافات ٢٠ و ٣٠ سم على الترتيب . وربما يعود سبب ذلك إلى علاقة هذه الصفة بوزن الجوزة وحاصل القطن الشعير. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه الحمداني (٢٠٠٢) إلى عدم وجود اختلاف بين مسافات الزراعة في صفة دليل التيلة.

حاصل القطن الزهر (كغم/دونم): يلاحظ من نتائج الجدول (٢) إلى وجود اختلاف بين مسافات الزراعة في صفة الحاصل الزهر إلا أن هذا الاختلاف لم يصل إلى حد المعنوية إذ بلغ معدل هذه الصفة ٧٩ و ٧٦٨ و ٨١٣.٥٦٠ كغم/دونم وللمسافات ٢٠ و ٣٠ سم على الترتيب . وهذه النتيجة تتفق مع ما وجدته كل من الباحثين Esparza و Pedrozn (١٩٩٧)) الذين أشارا إلى عدم وجود اختلاف معنوي لصفة حاصل القطن الزهر باختلاف الكثافة النباتية

حاصل القطن الشعر (كغم/دونم): تشير نتائج الجدول (٢) إلى وجود اختلاف بين مسافات الزراعة في حاصل القطن الشعر إلا أن هذا الاختلاف لم يصل إلى حد المعنوية إذ بلغ معدل هذه الصفة ٢٦٥.١٢٠ و ٢٨٢.٨٢٠ كغم / دونم والمسافات ٢٠ و ٣٠ سم على الترتيب، وقد سلكت هذه الصفة سلوك حاصل القطن الزهر .

تصافي الحليج %: توضح نتائج الجدول (٢) عدم وجود اختلاف بين مسافات الزراعة في صفة تصافي الحليج حيث بلغ معدل هذه الصفة ٣٤.٦١١ و ٣٤.٧٢٢ % وللمسافات ٢٠ و ٣٠ سم على الترتيب . وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه Norton (٢٠٠٥) الذي أشار إلى عدم وجود اختلاف بين مسافات الزراعة بين النباتات لصفة تصافي الحليج .

تأثير مواعيد : إضافة السماد النيتروجيني :

صفات النمو :

ارتفاع النبات (سم) : تشير النتائج الموضحة في الجدول (٣) إلى وجود اختلاف معنوي بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني في صفة ارتفاع النبات ، إذ تفوق الموعد الأول لإضافة السماد النيتروجيني الذي أعطى أعلى معدل للصفة بلغ ٣٠ ١٤٠ سم والذي لم يختلف معنوياً عن الموعد الثاني، بينما أعطى الموعد الثالث لإضافة السماد النيتروجيني أقل معدل للصفة بلغ ٥ ١٣١ سم ، وقد يعزى سبب ذلك إلى أن توفر عنصر النيتروجين في المراحل المبكرة وبالكمية المثلى يؤدي إلى زيادة في عدد العقد على الساق وزيادة في استطالة السلاسل نتيجة الزيادة في انقسام وتوسع الخلايا .

عدد الأفرع الخضرية /نبات : تبين نتائج الجدول (٣) عدم وجود فروق معنوية بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني ، حيث بلغ معدل هذه الصفة ٢١٤ ١٧٢ ٢١٦ ٢١٧ و لمواعيد اضافة السماد النيتروجيني الاول والثاني والثالث على الترتيب. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه حميد (٢٠٠١) والتي أشارت إلى أن موعد إضافة السماد النيتروجيني لم يؤثر على عدد الأفرع الخضرية / نبات .

عدد الأفرع الثمرية / نبات : يلاحظ من البيانات الواردة في الجدول (٣) إلى وجود اختلاف بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني الا ان هذا الاختلاف لم يصل حد المعنوية ، إذ تفوق الموعد الأول لإضافة السماد النيتروجيني على المواعيد الأخرى حيث أعطى اعلى معدل للصفة بلغ ٦٥ ١٦ فرع ثمري في حين بلغ معدل هذه الصفة لمواعيد إضافة السماد النيتروجيني الثاني والثالث ١٣.٧٩٢ و ١٣.٦٦٧ فرع ثمري على الترتيب. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه Ghourab وآخرون (١٩٩٥) الذين أشاروا إلى وجود اختلاف في صفة عدد الأفرع الثمرية /نبات بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني .

الحاصل ومكوناته :

عدد الجوز الكلي / نبات : توضح النتائج الموجودة في الجدول (٣) الى وجود اختلاف بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني لصفة عدد الجوز الكلي / نبات لكن الاختلاف لم يصل حد المعنوية اذ اعطى الموعد الثالث لاضافة السماد النتروجيني اعلى معدل للصفة بـ ٢٢ ٣٢ جوزة/نبات في حين

بلغ معدل هذه الصفة ٤٤٢/٣٠ ٦٦/٣٠ ٣٠ جورة /نبات لمواعيد إضافة السماد النيتروجيني الأول والثاني على الترتيب .

وزن الجوزة (غم) :توضح النتائج الواردة في الجدول (٣) عدم وجود فروق معنوية بين مواعيد تجزئة اضافة السماد النيتروجيني في صفة وزن الجوزة ، إذ بلغ معدل هذه الصفة ٢٣ ٤ ٢٣/٤ ٤ غم لمواعيد إضافة السماد النيتروجيني الأول والثاني والثالث على الترتيب ، وهذه النتيجة تتماشى مع ما وجدته Ghourab وآخرون (١٩٩٥) .

دليل البذرة (غم) : يوضح الجدول (٣) عدم وجود فروق معنوية بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني في صفة دليل البذرة ، إذ بلغ معدل هذه الصفة ١٠ ١١.٣٥٨ و ١٠ ١١.٣٥٨ و ١٠ ١١.٣٥٨ غم ولمواعيد إضافة السماد النيتروجيني الأول والثاني والثالث على الترتيب وهذه النتيجة تتفق مع ما وجدته حميد (٢٠٠١) و Ghourab وآخرون (١٩٩٥) الذين أشاروا إلى عدم وجود تأثير لمواعيد إضافة السماد النيتروجيني في صفة دليل البذرة .

دليل التيلة (غم/شعر/مائة بذرة): تبين نتائج الجدول (٣) عدم وجود فروق معنوية بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني لصفة دليل التيلة ، إذ بلغ معدل هذه الصفة ١٥٣٥.٦٦٩ ١٥٣٥.٦٦٩ ١٥٣٥.٦٦٩ غم ولمواعيد إضافة السماد النيتروجيني الأول والثاني والثالث على التوالي ، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه حميد (٢٠٠١) والتي أشارت إلى عدم وجود تأثير لمواعيد إضافة السماد النيتروجيني في صفة دليل التيلة . **حاصل القطن الزهر (كغم / دونم)** : يلاحظ من نتائج الجدول (٣) وجود فروق معنوية بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني في صفة حاصل القطن الزهر . وقد تفوق الموعد الثالث لإضافة السماد النيتروجيني الذي أعطى أعلى معدل للصفة بلغ ٩١ ٨٩٠ كغم / دونم ولم يختلف معنوياً عن الموعد الثاني لإضافة السماد النيتروجيني الذي أعطى معدل للصفة بلغ ٧٧١.١١٠ في حين أعطى الموعد الأول لإضافة السماد النيتروجيني أقل معدل للصفة بلغ ٧١١.٥٠٠ كغم / دونم . ربما أدى وجود السماد النيتروجيني بشكل متوازن إلى زيادة في حجم النبات وبالتالي انعكس على كفاءة التمثيل الضوئي ومن ثم زيادة الحاصل بالإضافة إلى ذلك علاقة الحاصل بعدد الجوز / نبات والتي كانت أكبر عند الموعد الثالث لإضافة السماد النيتروجيني . وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه Memon وآخرون (٢٠٠١) الذين أشاروا أن حاصل القطن الزهر يزداد عند إضافة السماد النيتروجيني على عدة دفعات مقارنة بإضافته على دفعة واحدة أو دفعتين .

حاصل القطن الشعر (كغم / دونم) : تشير النتائج الواردة في الجدول (٣) وجود اختلاف معنوي بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني في صفة حاصل القطن الشعر ، إذ تفوق الموعد الثالث لإضافة السماد النيتروجيني الذي أعطى أعلى معدل للصفة بلغ ٣٠٥.٥٦٠ كغم / دونم ولم يختلف معنوياً عن الموعد الثاني لإضافة السماد النيتروجيني الذي أعطى معدل للصفة بلغ ٣٠٦ ٢٧١ كغم /دونم بينما أعطى الموعد الأول لإضافة السماد النيتروجيني أقل معدل لهذه الصفة بلغ ٩٩ ٢٤٤ كغم /دونم. وقد يعود سبب ذلك إلى علاقة صفة حاصل القطن الشعر بصفة حاصل القطن الزهر حيث سلكت هذه الصفة سلوكاً مشابهاً لصفة حاصل القطن الزهر .

تصافي الحليج % :توضح النتائج الواردة في الجدول (٣) عدم وجود اختلاف معنوي بين مواعيد إضافة السماد النيتروجيني لصفة نسبة صافي الحليج المئوية ، إذ بلغ معدل هذه الصفة ٥٠٨ ٣٥ ٥٠٠ ٣٤ و ٣٤.٤١٦ % ولمواعيد إضافة السماد النيتروجيني الأول والثاني والثالث على الترتيب . وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه حميد (٢٠٠١) إلى عدم وجود فروق معنوية لمواعيد اضافة السماد النيتروجيني في صفة تصافي الحليج .

التداخل بين الاصناف والتراكيب الوراثية ومواعيد ضافة السماد النيتروجيني:

تبين من نتائج التحليل الاحصائي عدم وجود تداخل معنوي بين جميع صفات النمو والحاصل ومكوناته لمحصول القطن ولجميع عوامل الدراسة الثلاثة، الاصناف ومسافات الزراعة ومواعيد اضافة السماد النيتروجيني وهذا يعني ان كل عامل يؤثر بصورة مستقلة عن العوامل الاخرى.

GROWTH AND YIELD RESPONSE OF TWO COTTON CULTIVAR FOR PLANT DENSITY AND DATE OF NITRONEN FERTILIZATION

S.M.I. Al-jobouri

College of Agric.and Forestry
University of Mosul

Y.E.H.Al-lihibi

General company for
cereals trading quality control

ABSTRACT

The study was conducted to investigate the effect of two cultivars, Lachata and Coker 310, two plant densities 20, 30 cm between each plant and three application dates of nitrogen fertilizer (first date: half recommended at sowing and half at boll formation stage. Second date: half recommended at sowing and half after 30 days from sowing. Third date: quarter recommended at sowing and half after 30 days and quarter at boll formation stage) on growth properties, yield and yield components. The study included a field experiment in summer season 2005 at Alshirqat location (150 km north Tikrit city). The randomized complete block design (RCBD) with three replications was used. The results showed that cultivar Coker 310 was significantly superior compared with Lachata in the plant height, while the Lachata variety was significantly superior in boll weight character. Plant sown at densities of 30 cm were significantly higher at plant height, number of vegetative and sympodia branches /plant, the total number of boll / plant as compared of those plant sown at 20 cm. The height plant was significantly higher at first application dates of nitrogen, whereas the total yield weight and lint yield was significantly higher in third application date.

المصادر

- جاسم، كريمة كريم وآمال سلمان ثاني (٢٠٠٥). تأثير الكثافة النباتية على حاصل ونوعية صنفين من القطن. مجلة الزراعة العراقية ١٠ (١): ٢٢ - ٣٠.
- حسن، نوري عبد القادر وحسن يوسف الدليمي ولطيف عبد الله العيثاوي (١٩٩٠). خصوبة التربة والأسمدة. مطبعة دار الحكمة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد: ٣٣٦ صفحة.
- الحمداني زكريا بدر فتحي (٢٠٠٢). تقييم الحاصل ومكوناته وخواص الألياف وسلوك الاستقرار في أصناف مختلفة من القطن (*Gossypium hirsutum* L.). رسالة ماجستير. كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل. العراق.
- حميد، رجاء مجيد (٢٠٠١). تأثير تجزئة إضافة السماد النيتروجيني في نمو وحاصل صنفين من القطن (*Gossypium hirsutum* L.). رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة الأنبار. العراق.
- خير، عصام الدين محمد (٢٠٠٠). تحليل القدرة الاتحادية وقوة الهجين للحاصل ومكوناته وصفات التيلة في عشرة أصناف من القطن وهجنها التبادلية الكاملة. أطروحة دكتوراة، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل.
- داود، خالد محمد وعلي حسين علي (١٩٩٩). تقييم أربعة أصناف من القطن في حقول الفلاحين في نينوى. البرنامج الوطني لتطوير زراعة القطن في العراق. التقرير السنوي لعام ١٩٩٩: ٥٨-٦٠.
- الراوي، خاشع محمود وعبد العزيز محمد خلف الله (٢٠٠٠). تصميم وتحليل التجارب الزراعية. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل: ٤٨٨ صفحة.
- عبد السلام، محمد (١٩٨٠). تكنولوجيا انتاج وتصنيع القطن المصري: ٣٥٢ صفحة.
- عبد علي، حكمت ومجيد الانصاري (١٩٨٠). محاصيل الألياف. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد. العراق: ٢٤٠ صفحة.
- الغزال، رامي كف (١٩٩٤). المحاصيل الحقلية. جامعة حلب، كلية الزراعة، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية. الجزء الأول: ٢٧٢ صفحة.
- الفرس، عباس منير (١٩٩٠). محاصيل الألياف. جامعة حلب كلية الزراعة، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية: ٤٢٣ صفحة.

النداوي ابراهيم سعيد احمد (١٩٩٧). التداخل بين التراكيب الوراثية والبيئة في القطن (*Gossypium hirsutum* L.) المزروع في عدة مناطق من العراق. أطروحة دكتوراه كلية الزراعة جامعة بغداد. العراق.

- Akhtar, M., M.J. Cheema., M. Jamil., M.R. Farooq and M.Aslam (2002). Effect of plant density on four short statured cotton varieties. Asian J. of Plant Sci. 1 (6): 644-645.
- Christidis, B.G. and G.J. Harrison (1955). Cotton growing problems. Mc. Grow-Hill Book Co. Snc New York.
- Clawson, E.L., J.T. Cothren and D.C. Blovin (2006). Nitrogen fertilization and yield of cotton in ultra-narrow and conventional row spacings. Agron. J. 98: 72-79.
- Esparza, M.J.H. and A.S. Pedroza (1997). Effect of plant density and harvesting date on yield and quality of cotton ITEA. Production regetal, 93: 94-103.
- Ghourab, H.H., O.M.M. Wassel. And M.S. Saeed (1995). Effect of some nitrogenous and nitrogen rates on yield and quality of Egyptian cotton. Zagazigs. Agric. Res. 22 (4): 955-961.
- Krieg, D. R. (1996). Physiological aspects of ultra-harrow row cotton production. P. 66. In P. Dugger and D. Richter (Ed) proc. Belt wide cotton cont. Nashville: TN. 9 – 12.
- Memon, A. A., A. W. Soomro., G. H. Kolwar., M. H. Arain. and M. N. Kalwar (2001). Impact of nitrogen fertilizer on newly developed cotton varieties under Sakrand conditions. J. of Biol. Sci: 1 (4): 293 – 294.
- Nichols, S. P., C. E. Snipes. and M. A. Jones (2004). Cotton growth lint yield and fiber quality as affected by row Spacing and cultivar. J. Cotton Sci. 8: 1 – 12.
- Norton, E. J. (2005). Evaluation of plant population affection lint yield and fiber quality Arizona cotton report (P – 142).