بشار زكي امين قصاب باشي
ايسر محمد سالم سعيد المعماري
قسم البستنة / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل / العراق

عقد لصنفين من نباتات القرنفل هما "Jeanne Dionis Blanco"

الأزهار البيضاء و " Marie Chaboud Jaune " ذو الأزهار الصفراء
المجهز بـ لينتين بالتراكيز صفرو ٤.٠ و ٦.٠ و ٨.٠ ملغم/لتر وأخذت البيانات بعد أربعة وثمانية أسابيع رعاة، لتجذير اطراف الصنف الابيض الناتجة من التضاعف زرعت على وسط MS نصف تركيز الاملاح IAA تشير النتائج الى أن اطراف الافرع استجابت للزراعة في ظروف المختبر بنسبة ١٠٠% وعدم وجود فروقات معنوية في معدل عدد الافرع لكلا الصنفين عند مرحلة التضاعف ، وتم الحصول على اعلى المعدلات لعدد الافرع ١٤.٩٥ افرع/جزء نباتي من زراعة اطراف الافرع عند التركيز ٨ ملغم/لتر Kin في مرحلة التضاعف و تم الحصول على اعلى المعدلات لعدد الافرع / اطراف افرع الصنف الابيض على وسط MS المزود بـ ٨ ملغم/لتر Kin . تكن هناك معنوية في معدل عدد الافرع من زراعة عقد كلا الصنفين الابيض والاصفر التضاعف وتم الحصول على اعلى معدل لعدد الافرع ٠.٧ / عند التركيز ٢ ملغم/لتر Kin في حين كان اعلى معدل لعدد الافرع ٠.٧ / من زراعة عقد الصنف الاصفر على وسط MS / Kin اعلى نسبة تجذير % الصنف الابيض / تركيز الاملاح والمزود بـ IAA / ، جميع النباتات الناتجة من الزراعة النسيجية MS اقلتها في المختبر وبعدها نقلت الى البيت الزجاجي لتنمو بشكل طبيعي.

Dianthus caryophyllus احد نباتات العائلة القرنفلية Caryophyllaceae وهو

معمّر يفضل تجديد زراعته سنوياً، وجد نامياً برياً
 يعلو - سم ، أوراقه متقابلة سميكة شمعية شريطية الشكل ، الأزهار ذات ألوان عديدة و رائحة عطرية
 وقد يصل قطرها إلى أكثر من سم وتعد من الأزهار الصالحة للقطف (Anonymous) .
 يستعمل لأغراض طبية عديدة وله تأثير مضاد للفيروسات والتهابات المفاصل والنقرس ومنقي جيد للدم
 (العاني وآخرون ، ٢٠٠١) . ويتكاثر إما بالبذور أو خضرياً بالعقل أو بالترقيد (السلطان وآخرون ، ١٩٩٢)
 لاحظ العديد من الباحثين إن الساييتوكاينينات تلعب دوراً في تضاعف العديد من الأجزاء النباتية إذ ذكر
 Onamu وآخرون (٢٠٠٣) أن زراعة أطراف أفرع نبات القرنفل على وسط MS المجهز بـ ٠.٢ ملغم /
 لتر Kin مع ٠.٢ ملغم / لتر NAA أدى إلى الحصول على أعلى معدل لعدد الأفرع ١٤ فرعاً / جزء نباتي
 بمعدل طول ١.١٨ سم . ووجد Salehi (٢٠٠٦) أن أحسن وسط للتضاعف أطراف أفرع نبات القرنفل هو
 MS المجهز . / Kin . / NAA /
 جزء نباتي ، وعند إعادة الزراعة على نفس الوسط السابق بلغ عدد الأفرع

على وسط MS المجهز بالتراكيز . ملغم / لتر Kin ، أن الوسط المجهز بتركيز ١٥.٠ ملغم / لتر أدى إلى الحصول على أعلى معدل لعدد الأفرع ١٥.٩ فرع / جزء نباتي ، وذكر Bora وآخرون (٢٠٠٧) أن أعلى تضاعف تم الحصول عليه كان من زراعة أطراف أفرع نبات القرنفل على وسط MS المجهز بـ ١.٥ ملغم / لتر Kin مع ٠.٥ ملغم / لتر NAA مع ٠.٥ ملغم / لتر GA₃ . وذكر Bohidar وآخرون (٢٠٠٨) عن زراعة

تاریخ تسلیم البحث / / وقبوله /

عقد نبات السذب *Ruta graveolens* L. الناتجة من الزراعة النسيجية أنها أعطت أعلى معدل من ٥٠ فرع/جزء نباتي وبمعدل طول ٣.٢ سم من زراعتها على وسط MS المجهز بـ ٢.٠ ملغم/ Kin. بين العديد من الباحثين أن هناك تفاوتاً في استجابة الأصناف للاكثار وضمن النوع الواحد معتمداً

ذلك على المادة الوراثية لكل صنف إذ بيّن Salehi (٢٠٠٦) أن هناك تفاوت في معدل عدد الأفرع من زراعة عقد نبات القرنفل على وسط MS ١.٠ ملغم / لتر BA مع ١.٠ ملغم / لتر NAA لأربعة عشر صنفاً إذ تم الحصول على ٥ فروع / جزء نباتي من زراعة عقد الصنف " Graziella " / " Tempo " . " Rotem " / .

وذلك بعد أربعة أسابيع من الزراعة . تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة استجابة صنفين من نبات القرنفل التجاري وهما الصنف "Jeanne Dionis Blanco" ذو الأزهار البيضاء والصنف "Marie Chabaud Jaune" ذو الأزهار الصفراء للاكتثار بتقنية الزراعة النسيجية وذلك باستخدام أجزاء نباتية مختلفة للزراعة على أوساط غذائية مجهزة بتركيز مختلفة من الكاينتين للحصول على أكبر عدد من الفروع على الجزء النباتي المزروع فضلاً عن دراسة تجذير النموات الناتجة من الزراعة النسيجية وأقلمتها في المختبر بهدف وضع بروتوكول خاص لإكثار القرنفل بالزراعة النسيجية.

مواد البحث وطرقه

أجريت هذه الدراسة في مختبر زراعة الخلايا والأنسجة النباتية التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق بكلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل لـ / / / ولغاية / / . أجزاء نباتية متمثلة بأطراف الأفرع والعقد لصنفين من نبات القرنفل هما "Jeanne Dionis Blanco" الأزهار البيضاء و "Marie Chabaud Jaune" ذو الأزهار الصفراء - سم من أمهات نامية في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة المزروعة في أصص فخارية قطر سم وبعمق سنتين ، نقلت إلى المختبر وأزيلت منها جميع الأوراق ووضعت تحت الماء الجاري لمدة دقائق بعدها عُمِّمت بمحلول NaOCL % (:) دقيقة مع إضافة المادة Tween-20 - دقائق لكل مرة بعدها قطعت الاجزاء النباتية ليصبح طولها / كاينتين من تضاعف الصنف الأبيض أخذت بطول . - سم واعيدت زراعتها على وسط MS بنصف تركيز المزود بالتركيز IAA / بهدف التجذير . النباتات الناتجة من التجذير زرعت في سنادين مزودة بوسط اكثار متمثل بالبي . استعملت لزراعة الاجزاء النباتية قناني زجاجية حجم pH ، وغطيت فوهة القنينة بورق الألمنيوم ، بعدها تم تعقيم الوسط الغذائي بجهاز المؤصدة (Autoclave) دقيقة بعد زراعة جميع الاجزاء النباتية للتجارب المختلفة نقلت الزروع الى غرفة النمو تحت شدة اضاءة فترة ضوئية / يوم مجهزة من أنابيب الفلورسنت البيضاء وبدرجة حرارة ± . تنفيذ تجارب النشوء والتضاعف التصميم العشوائي الكامل للتجارب العملية Factorial Experimental Within Complete Randomized Design مع استخدام التصميم العشوائي الكامل CRD التجذير Duncan's multiple range test % (داؤود وعبد الياس ،)

النتائج والمناقشة

يبين الجدول () استجابة صنفين من نبات القرنفل للنشوء والتضاعف من زراعة أطراف الأفرع MS أسابيع من الزراعة إذ أن % ولكلا الصنفين ويبين الجدول انه لا توجد فروقات معنوية من زراعة أطراف أفرع الصنفين الأبيض والأصفر في مرحلة النشوء وان أطراف أفرع الصنف الأصفر أعطت أعلى أطوال الصنف الأبيض وتم الحصول على أعلى معدل لعد الأبيض وتفق معنوي على عدد الأوراق للصنف الأصفر ، وعند مراجعة نتائج مرحلة التضاعف نلاحظ عدم وجود فروقات معنوية في معدل عدد الصنفين، كما تبين النتائج

الأبيض والتي تفوقت معنوياً على معدلات الصنف الأصفر ، ربما تعود هذه الاختلافات إلى العوامل الوراثية بين الأصناف من حيث حالتها الفسيولوجية والتشريحية ومحتواها من الهرمونات النباتية (Hartmann). (

() : استجابة صنفين *D. caryophyllus* MS
أسابيع

(أسابيع من الزراعة)			(أسابيع من الزراعة)				النسيجية (%)	الأبيض
	()			()				
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.

*الأرقام ذات الأحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد لا تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد المدى تحت مستوى % .

يبين الجدول () تأثير Kin

MS

أسابيع من الزراعة إذ أن نسبة استجابة أطراف الأفرع لـ % ولجميع معاملات الكاينتين ، وان جميع معاملات Kin المختلفة تفوقت معنوياً على معاملة /

المجهز / Kin

تختلف معنوياً مع باقي Kin / ، هذه المعاملة اختلفت معنوياً مع معاملة المقارنة إلا إنها لم تختلف معنوياً مع باقي Kin /

() : تأثير Kin *D. caryophyllus* نبات
أسابيع من الزراعة MS

(أسابيع من الزراعة)			(أسابيع من الزراعة)				تركيز Kin /
	()			()			
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

*الأرقام ذات الأحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد لا تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى % .

سم وهذه بدورها تفوقت معنوياً عن معدلات باقي المعاملات لهذه الصفة ، كما أن هذه المعاملة (Kin /) تفسر هذه النتائج على أن Kin وهذه بدورها تفوقت على معدلات باقي المعاملات الأخرى أنواع الساييتوكاينينات والتي تلعب دور في القضاء على السيادة القمية وبالتالي زيادة عدد الافرع على الجزء المزروع بزيادة التركيز وصولاً إلى الحد الأمثل (Hiiner Hopkins) . (

يبين الجدول () استجابة صنفين من القرنفل لتراكيز م Kin أسابيع من الزراعة، إذ أن نسبة استجابة أطراف أفرع نباتات القرنفل للزراعة في ظروف المختبر ولكلا الصنفين الأبيض والأصفر كانت ١٠٠ % ولجميع Kin المختلفة، كما يبين الجدول أن التراكيز المختلفة للـ Kin أدت إلى زيادة معدلات عدد الأفرع لكلا الصنفين مقارنة مع نباتات المقارنة لكل صنف ()

الجدول () : استجابة صنفين من القرنفل *D. caryophyllus* لتراكيز مختلفة من الـ Kin في نشوء MS أسابيع من الزراعة.

الصنف	تركيز Kin ملغم/لتر	مرحلة النشوء (بعد ٤ أسابيع من الزراعة)				مرحلة التضاعف (بعد ٨ أسابيع من الزراعة)		
		معدل عدد الأفرع	معدل طول أطول فرع (سم)	معدل عدد الأوراق	معدل طول أطول فرع (سم)	معدل عدد الأفرع	معدل طول أطول فرع (سم)	معدل عدد الأوراق
الأبيض	صفر	١٠٠	٢.٤٠ ج	١٧.٤٠	٣.١٠ ج	١١.٨٠	٣.٤٠ و	٧.٦٠
	٢.٠	١٠٠	٢.٤٠ ج	١٧.٠٠	٣.٤٠ ج	١١.٨٠	٣.٤٠ و	٧.٦٠
	٤.٠	١٠٠	٢.٨٠ ج	٣.٥٠ ب	١٧.٤٠	١٢.١٠ ب	٣.٤٠ و	١١.٨٠
	٦.٠	١٠٠	٤.١٠ ج	٣.١٠ ب	١٦.٤٠	١١.٣٠ ب	٣.٦٠ ج	١٠.٢٠ ج
الأصفر	٨.٠	١٠٠	٥.٥٠ أ	٢.٦٠ ب	١٦.٩٠	١١.٦٠ ج	٢.٧٠ هـ	٨.٦٠ ج
	صفر	١٠٠	١.٩٠ د	١٤.٥٠ أ	٦.٨٠ أ	٤.٤٠ ج	٤.١٠ ج	٧.٠٠
	٢.٠	١٠٠	٤.٢٠ ج	٣.٢٠ ج	٦.٠٠ ج	١٠.٨٠ ب	٥.٢٠ أ	١٠.٦٠ ج
	٤.٠	١٠٠	٦.٧٠ أ	٢.٩٠ ب	٦.٦٠ أ	١١.٢٠ ب	٥.٩٠ أ	١١.٨٠
	٦.٠	١٠٠	٤.٠٠ ج	٢.١٥ د	٥.٢٠ ج	١١.٤٠ ب	٢.٣٥ و	٦.٨٠
	٨.٠	١٠٠	٥.٥٠ أ	٢.١٥ د	٦.٦٠ أ	١١.٣٠ ب	٢.٩٠ ج	٧.٠٠

* أم ذات الأحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد لا تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال %

الحصول على أعلى المعدلات / فرع / جزء نباتي من زراعة أطراف الأفرع للصنف الأصفر على الوسط المجهز / Kin والذي تفوق معنوياً على أغلب المعاملات ولكلا الصنفين عدا معاملة ملغم / لتر Kin للصنف الأصفر والأبيض، وتم الحصول على أعلى معدل لعدد الأفرع للصنف الأبيض / جزء نباتي من معاملة ٨.٠ ملغم / لتر Kin، وعند إعادة الزراعة لأربعة أسابيع أخرى، أعلى معدل لعدد الأفرع ١٦.٩ فرع / جزء نباتي من الزراعة على Kin للصنف الأبيض والذي تفوق معنوياً على نباتات المقارنة لكلا الصنفين والتي كانت معدلاتها ٣.١٠ و ٤.٤٠ فرع / جزء نباتي للصنف الأبيض والأصفر على التوالي. كما يبين الجدول الحصول على أعلى معدل لطول أطول فرع ٤.٥٥ سم من معاملة المقارنة للصنف الأصفر والذي تفوق معنوياً على جميع المعاملات وذلك عند مرحلة النشوء في حين كان هذا المتوسط في مرحلة التضاعف ٦.٤٠ سم من زراعة الصنف الأبيض على الوسط المزود بـ ٤.٠ ملغم / لتر Kin، كما يوضح الجدول

للصنف الأبيض، أما في مرحلة التضاعف فيبين الجدول الحصول على زراعة الصنف الأصفر على الوسط المزود Kin / Kin () يوضح تأثير Kin في تضاعف أطراف أفرع نبات القرنفل للصنفين الأبيض والأصفر. يمكن تفسير هذه النتائج على ضوء مآذرك تفسيره في نتائج كل من استجابة الاصناف وتأثير الكاينتين.

() : تأثير تراكيز مختلفة من Kin
"Marie"
Dianthus caryophyllus
(أسابيع من الزراعة) Chabaud Jaune

() : تراكيز مختلفة من Kin
"Jeanne"
Dianthus caryophyllus
(أسابيع من الزراعة) Dionis Blanco

يبين الجدو () استجابة صنفين من القرنفل في نشوء وتضاعف العقد أسابيع من الزراعة إذ ان عقد الصنف الأبيض اسد % وبشكل معنوي مقارنة مع عقد الصنف الأصفر والتي كانت نسبة استجابتها %، كما بين الجدول ان عقد الصنف الأصفر تفوقت معنوياً على عقد الصنف الأبيض في صفة عدد الأفرع النامية / ، وتفوق الصنف الأصفر في معدل طول أطول فرع على الصنف الأبيض MS

() : استجابة صنفين من القرنفل *D. caryophyllus* في نشوء وتضاعف العقد المزروعة على أسابيع من الزراعة . MS

الاصنف	مرحلة النمو (بعد ٤ أسابيع من الزراعة)			مرحلة التضاعف (بعد ٨ أسابيع من الزراعة)		
	الاستجابة للزراعة (النسجيجة %)	معدل عدد الأفرع	معدل طول أطول فرع (سم)	معدل عدد الأوراق	معدل طول الفرع (سم)	معدل عدد الأوراق
الابيض	١٧٢	٢.٩٠ ب	١.٤٨ ب	٥.٦٠ ب	٣.٣٣ ب	٧.٨٨ ب
الاصفر	٥٤ ب	٣.٣٢ أ	٣.١١ أ	٧.٥٦ أ	٨.١٠ أ	١٠.٣٦ أ

* الأرقام ذات الأحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد لا تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال %.

وبدورها تفوقت معنوياً على معدل عدد الأوراق للصف الأبيض وذلك عند مرحلة النشوء .
نتائج مرحلة التضاعف تبين انه لا
الابيض أعطى .
وقات معنوية في معدلات عدد الأفرع لكلى الصنفين وان الصنف
/جزء نباتي، كما بين الجدول الحصول على أعلى

تفسير هذه النتائج . ورقة والتي بدورها تفوقت معنوياً على معدلات الصنف الأبيض، ويمكن ذكر في تفسير نتائج الجدول () .

يبين الجدول () تأثير Kin / MS
أسابيع من الزراعة إذ ان العقد اختلفت في استجابتها للزراعة في ظروف المختبر تبعاً
للتراكيز المختلفة من Kin /
وهذه بدورها تفوقت معنوياً على باقي المعاملات، وكان هناك اختلافات معنوية في معدل عدد الأفرع في
Kin /
والتي بدورها تفوقت معنوياً على معاملة Kin / ومعاملة المقارنة ولكنها لم تختلف
معنوياً مع باقي المعاملات ، ويبين الجدول ان المعاملات المختلفة من Kin / تفوقت معنوياً على معاملة
Kin /
وبلاحظ عدم وجود فروقات معنوية لـ

Kin / . أما فيما يخص مرحلة Kin / .
Kin / . بدورها تفوقت معنوياً على باقي المعاملات، كما بين الجدول الحصول على أعلى معدل لعدد الأوراق على Kin / والتي تفوقت معنوياً على معاملة المقارنة ومعاملا Kin / يمكن تفسير هذه النتائج على ضوء ما ذكر في تفسير نتائج الجدول () .

D. caryophyllus () : تأثير الـ Kin

أسابيع من الزراعة		تركيز	MS
(أسابيع من الزراعة)	(أسابيع من الزراعة)		

Kin /	النسجية (%)	()	()	()	()	()
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

*الأرقام ذات الأحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد لا تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد المدى عند مستوى احتمال % .

يبين الجدول () استجابة صنفين من القرنفل *D. caryophyllus* لتراكيز مختلفة من الـ Kin أسابيع من الزراعة إذ ان عقد الصنف الأبيض MS

معنوية للمعاملات المختلفة لكلا الصنفين إذ تم الحصول على أعلى نسبة استجابة % .
 . / Kin للصنف الأبيض ، في حين كانت أعلى استجابة % . / Kin
 Kin كانت تؤدي إلى زيادة معدلات عدد الأفرع لكلا الصنفين مقارنة مع نباتات المقارنة ، إذ تم الحصول على أعلى معدل لعد
 . / لتر للصنف الأصفر ، في حين كانت هذه القيمة . /
 الأبيض واللذان لم تختلفا معنوياً فيما بينهما وذلك في () ، كما بين الجدول لنفس المرحلة أن معدلات
 للصنف الأصفر كانت أعلى من معدلات طول أطول فرع للصنف الأبيض، وتم الحصول على
 . / Kin للصنف الأصفر، في حين كان أعلى معدل لطول أطول فرع
 . / Kin للصنف الأبيض وكان أعلى معدل لعدد الأوراق على أطول فرع .
 . / Kin للصنف الأصفر، في حين كانت أعلى القيم لعدد الأوراق على أطول فرع
 للصنف الأبيض . / Kin ، ومن مراجعة نتائج مرحلة التضاعف نلاحظ زيادة
 . /
 . / Kin من زراعة عقد الصنف الأصفر، في حين كان أعلى معدل لعدد
 الأفرع للصنف الأبيض . / Kin
 . / Kin للصنف الأصفر في حين كان أعلى معدل لطول أطول
 فرع للصنف الأبيض . / Kin
 . / Kin
 للصنف الأبيض . ورقة على أطول فرع عند المعاملتين . / Kin ، يمكن تفسير هذه
 ذكر تفسيره في نتائج استجابة كل من الاصناف وتأثير Kin
 والشكلين () يوضحان تأثير الـ Kin للصنفين الأبيض والأصفر.

() : استجابة صنفين *D. caryophyllus* لتراكيز مختلفة من Kin أسابيع من الزراعة MS

الصنف	تركيز Kin ملغم/لتر	الاستجابة للزراعة النسجية (%)	مرحلة التثواء (بعد 4 أسابيع من الزراعة)			مرحلة التضاعف (بعد 8 أسابيع من الزراعة)		
			معدل عدد الأفرع	معدل طول أطول فرع (سم)	معدل عدد الأوراق	معدل عدد الأفرع	معدل طول أطول فرع (سم)	معدل عدد الأوراق
الأبيض	صفر	١٨٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٢٠	١٨٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٤٠	١٨٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٦٠	١٦٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٨٠	١٦٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
الأصفر	صفر	١٥٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٢٠	١٧٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٤٠	١٥٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٦٠	١٥٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	٨٠	١٥٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

د ٨.٢٠	ج ٣.٤٠	ب ١٠.٣٠	أ ٧.٤٠	١٣.٩٠	١٤.٠٠	١٥.٠٠	٦.٠٠
ب ١١.٠٠	د ٤.٥٠	أ ١٢.٧٠	ج ٦.٨٠	ب ٣.٣٠	د ٣.٧٠	١٥.٠٠	٨.٠٠

%

الأرقام ذات الأحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد لا تختلف معنوياً فيما بينها حسب اد

الشكل (٤) : تأثير تراكيز مختلفة من الـ Kin في تضاعف عقد نبات
القرنفل *Dianthus caryophyllus* للصفة الأصفر "Marie"
Chabaud Jaune" (بعد ٨ أسابيع من الزراعة)

الشكل (٣) : تأثير تراكيز مختلفة من الـ Kin في تضاعف عقد نبات
القرنفل *Dianthus caryophyllus* للصفة الأبيض "Jeanne"
Dionis Blanco" (بعد ٨ أسابيع من الزراعة)

وبين الجدول () تأثير IAA في تجذير أطراف أفرع نبات القرنفل الصنف الأبيض من الزراعة MS نصف تركيز الأملاح ، إذ تم الحصول على أعلى نسبة مئوية للتجذير % وبعد أيام . يوم وبعد جذور . /

انخفاض النسبة المئوية للتجذير إلى % وهذه المعاملة أعطت أعلى كمية كالس () يوضح تأثير التراكيز IAA. وهذه النتائج تفسر على أساس أن IAA هو أحد الاوكسينات التي تشجع التجذير وصولاً للتركيز الأمثل وأن زيادة التركيز أدت إلى تكوين الكالس والذي ربما يكون أحد الأسباب التي منعت ظهور الجذور ، زيادة التركيز يظهر تأثير يؤد استجابة عكسية (Hartmann) .

النباتات الناتجة من التجذير على تراكيز مختلفة من IAA

% - / IAA بعد ثمانية أسابيع

() .

() : تأثير إضافة تراكيز مذ IAA MS نصف تركيز الأملاح في قابلية تجذير

"Jeanne Dionis الأبيض الصنف *D. caryophyllus*

أمهات نسيجية بعد أسابيع من الزراعة.

Blano"

تركيز IAA (/)	النسبة المئوية للتجذير (%)	سرعة التجذير (يوم)	()	()	تكوين الكالس
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	+
.	.	.	.	.	++
.	.	.	.	.	++
.	.	.	.	.	+++

%

*الأرقام ذات الأحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد لا تختلف معنوياً فيما بينها

الشكل (٦): نباتات القرنفل *Dianthus caryophyllus* بعد ثمانية أسابيع من الأقلمة

الشكل (٥): تجذير أطراف أفرع نبات القرنفل للصنف الأبيض "Jeanne Dionis Blanco" من الزراعة في وسط MS نصف تركيز الاملاح المزود بتركيزات مختلفة من IAA (بعد ٨ أسابيع من الزراعة)

EEEECT OF KINETIN ON INITIATION AND MULTIPLICATION OF SHOOT TIPS AND NODES OF CARNATION IN VITRO

Basher Z. A. Kassab Bashy

Aysar M. S. Al – Mammary

Hort . Dept., College of Agric. and Forestry , Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT

Shoot tips and nodes of two carnation cultivars "Jeanne Dionis Blanco" a white flower cv. and "Marie Chabaud Jaune" a yellow flower cv. taken from the field were planted on MS medium supplemented with kinetin at (0.0 , 2.0 , 4.0, 6.0 , 8.0) ml/L. Shoots of "Jeanne Dionis Blanco" produced in vitro were rooted on half strength MS medium supplemented with IAA . Data shows that shoot tip response were 100% for in vitro culture . There is no significant differences on shoot numbers between the two cultivars in multiplication stage, shoot tips planting on MS medium supplemented with 8.0mg/L Kin gave the highest number 14.95 shoot/explant in multiplication stage and gave 16.90 shoot/explant for white cv., no significant differences between cultivars from culture node of the two cultivars at the multiplication stage highest shoots number 6.07 shoot/explant were obtained from the node culture on MS medium at 2.0 mg/L Kin and the highest shoot number 12.70 shoot were obtained from shoot tip culture of yellow cv. on MS medium supplemented with 8.0 mg/L Kin, shoots which produced in vitro for white cv. gave the highest rooting 50% with the highest root number 1.75 root/shoot when culture on half strength MS medium supplemented with 1.5 mg /L IAA . All the plantlets which produced in vitro acclimatized in laboratory then transferred to the greenhouse to grow normally.

المصادر

داؤود ، خالد محمد و زكي عبد الياس () : الطرق الإحصائية للأبحاث الزراعية . مطابع التعليم

() : الزينة ، مطابع دار الكتب

العاني ، لمياء محمد ومنى جاسم نوري وزينب ياسين محمد وعبد الهادي عبد الحميد الخماس ، (٢٠٠١):
 فعالية زيت القرنفل *Dianthus caryophyllus* العطري الطيار على حساسية مسببات الالتهابات
 المهبلية الفطرية " *Gandidiasts* ".
 قصاب باشي ، بشار زكي أمين وعمار زكي أمين قصاب باشي (٢٠٠٦) : تضاعف وتجذير أطراف فروع
Dianthus caryophyllus . مجلة زراعة الرافدين (٣) (٣٤) : ٥٩ -

- Anonymous (2006). The Biology and Ecology of *Dianthus caryophyllus* (Carnation). Australian Government , Department of Health and Ageing. (C.F. Al – Mahdawy , M. M. (2008) . Effect of mineral fertilization and some treatments on growth and flower longevity of two *Dianthus caryophyllus* L. cultivars . M. Sc. Thesis , College. Agric. & Forestry , Mosul. Univ.).
- Bohidar , S.; M. Thirunavoukkarasu and T.V.Rao(2008). Effect of plant growth regulators on *in vitro* micropropagation of " Garden Rue " (*Ruta graveolens* L.) International J. Integrative Biology , 3 (1) : 36 - 41.
- Bora , A. ; S. Singh ; T. C. Madhumita and B. N. Hazarika (2007) . An efficient method for *In vitro* plant regeneration in carnation . Indian J. Hort. Vol : 64 , ISSUE : 4 (Abst.)
- Hartmann , H. T. ; D. E. Kester ; F. T. Davies and R. L. Geneve (2002) . Plant Propagation Principles and Practices . 7th . ed . , Perntice Hall . Inc. New Jersey . USA .
- Hopkins , W. G. and N. P. A. Hiiner (2004) . Introduction to Plant Physiology, Third Edition . John Wiley and Sons , Inc .
- Onamu , R. ; S. D. Obukosia ; N. Musembi and M. J. Hutchinson (2003) . Efficacy of thidiazuron *in vitro* propagation of carnation shoot tip. Influence of dose and duration of exposure . African Crop Sci ., 11 (2) : 125 - 132.
- Salehi , H. (2006) . Can a general shoot proliferation and rooting medium be used for number of carnation cultivars .African J. of Biotechnology, 5 (1) : 025 - 030 .