تأثير التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر و مستويات مختلفة من السماد النتروجيني في

٢- صفات الحاصل لنبات البطاطا *Solanum tuberosum L.* *

خالدة عبد الله عمر
قسم البستنة وهندسة الحدائق / كلية الزراعة والغابات
جامعة الموصل

طه زبير سرحان
قسم البستنة / كلية الزراعة
جامعة دهوك

الخلاصة

نفذت الدراسة في حقول دائرة البحوث الزراعية ، زاخو ، شمال العراق ، خلال موسمي الزراعة ربيع . بهدف دراسة تأثير التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر *Azotobacter chroococcum* (+ -) مستويات متعدد من السماد النتروجيني (اليوريا N %) صفر ، ١٠٠ ، ٢٠٠ كغم/هكتار في صفات الحاصل لنبات البطاطا *Solanum tuberosum L.* صنف ديزريه ، نفذت التجربة بتصميم العشوائية الكاملة وبثلاث مكررات . أظهرت النتائج بان هناك زيادة معنوية في صفات الحاصل (عدد الدرناات ، وزن الدرناات، حاصل النبات الواحد ، والإنتاج الكلي لوحدة المساحة) وكذلك في النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرناات ، ونسبة العناصر الغذائية في الدرناات (N ,P ,K ,Ca) البروتين في الدرناات ، نتيجة لمعاملة التلقيح بالبكتريا ومعاملات إضافة السماد النتروجيني وخاصة المستوى ٢٠٠ كغم /هكتار ولكلا موسمي الدراسة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ وحدثت زيادة معنوية في وزن الدرناات وحاصل و الإنتاجية /هكتار نتيجة لمعاملة التداخل بين التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر والتسميد بمعدل كغم/هكتار وكانت أعلى القيم هي (، ، ، ،) / ٧٤ غم /هكتار (لصفات المدروسة أعلا وعلى التوالي ولل موسم الأول أما في الموسم الثاني فكانت هذه القيم (، ، ، ، ، ٣٠ ، ٧٨ غم ، ٤٨ ، ٩٥٤ غم و ٣٧ ، ٣٢ طن/هكتار . وأيضا تأثير معنوي في زيادة النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرناات ونسبة العناصر الغذائية والبروتين وللموسمين .

المقدمة

Potato (*Solanum tuberosum L.*) من أهم محاصيل الخضر في العالم وفي العراق وهي تتبع العائلة الباذنجانية ، وتعتبر من المحاصيل الغنية بالمواد الغذائية ، يحتوي كل البطاطا المقشرة على ٨٠ ، ٧٩ غم و ٧٦ سعرة حرارية و ١٠ ، ٢ غم بروتين و ١٠ ، ٠ غم دهون و ١٧ ، ٠ غم مواد كربوهيدراتية بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات ١ ، ٠ ملغم من الثيامين و ٤ ، ٠ ملغم من ريبوفلافين و ٥ ، ١ نياسين و ٢٠ ملغم من حامض الاسكوربيك (حسن ، ٢٠٠٣) . ويبلغ الإنتاج العالمي للبطاطا ٣٢٣ مليون طن لعام ٢٠٠٦ (FAO ، ٢٠٠٦) وتدل آخر إحصائية في العراق بان معدل الإنتاج ١٩ كان ٣ ، ٩٩٢ طناً / دونم العراقي (المجموعة الإحصائية العراقية السنوية ١٩٩٨) و(FAO) ، ومن خلال هذه الإحصائية نجد بان هناك انخفاض في معدل الإنتاجية ، أن كمية الحاصل ونوعيته تتأثر بعدد من العوامل أهمها عمليات الخدمة الزراعية ولاسيما عملية التسميد ، وتعد تقنية استخدام المخصبات من أهم الحزم التقنية وذلك بالاستخدام المرشد والمتكامل للأسمدة الكيماوية والحيوية ، وقد ثبت فعليا أن الإفراط في استخدام الأسمدة المعدنية يؤدي إلى كثير من الآثار السلبية ومن هنا برز مفهوم التسميد المتكامل وهو الجمع بين التسميد الكيماوي والحيوي . وبهدف المحافظة على خصوبة التربة ولاسيما أن معظم الأراضي في العراق تتميز بالقاعدية بجانب افتقارها للمادة العضوية والنشاط الحيوي والذين يمثلان احد المكونات الرئيسية في منظومة خصوبة التربة الثلاثية (الفيزيائية والكيميائية والحيوية) (الدورة التدريجية القومية حول استخدام المخصبات الحيوية ، ١٩٩٨) . لذا كان من الضروري وضع تجارب التسميد المتكامل بين الأسمدة الكيماوية والحيوية يعد جنس البكتيريا *Azotobacter* احد الأجناس البكتيرية المهمة واللاتعايشية التي لها القابلية على تثبيت النتروجين الجوي وكذلك تمتاز بإفرازها لعدد من المركبات مثل الاوكسينات ، الجبرلينات ، السايتوكاينينات ، والمضادات الحيوية للفطريات (والتي يمكن أن تساهم في إدامة خصوبة التربة وتحسين نمو وإنتاجية

تاريخ تسلم البحث / / وقبوله في / /

المحاصيل الزراعية (Stople Haller Forlain) ، وقد استخدمت بكتريا
الازوتوباكتر كسماد حيوي أو لقاح بكتيري في البطاطا (Sidorenko Vivek Kumar)

Shafeek (ونظرا لغياب دراسة التسميد المتكامل بين الأسمدة الحيوية والمعدنية في نمو وإنتاجية نبات البطاطا في العراق وخاصة المنطقة الشمالية فقد جاءت هذه الدراسة هادفة إلى زيادة الحاصل للبطاطا من خلال الجمع بين التسميد الحيوي بالتلقيح البكتيري ومع مستويات مختلفة من السماد المعدني النتروجيني تحت الظروف البيئية للمنطقة الشمالية في منطقة زاخو ، العراق .

مواد البحث وطرقه

نفذت الدراسة في الحقول التابعة لدائرة البحوث الزراعية ، زاخو / شمال العراق ، خلال موسمي الزراعة الربيعي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ ، بهدف دراسة تأثير الأسمدة الحيوية التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر *Azotobacter chroococcum* والسماد المعدني النتروجيني /يوريا ٤٦ % N في صفات النمو الخضري للبطاطا صنف ديزيرييه وذلك لكونه من الأصناف المرغوبة للزراعة في العراق وذات نمو خضري سريع ويتحمل الجفاف ودرناته كبيرة الحجم ذات لون احمر واللب فاتح اللون ، ومقاوم لفيروس Y بصورة جيدة جدا ولفيروس A بصورة جيدة ومنيع الإصابة بمرض التاليل (NIVAA) . اجري التحليل الكيميائي والفيزيائي للتربة قبل الزراعة ولموسمي الدراسة ()

() : صفات التربة الفيزيائية و الكيميائية لتربة حقل التجارب للموسمين ()

الموسم الربيعي	الموسم الربيعي	
التوزيع الحجمي لمفصولات التربة		
		الغرين
		الطين
طينية مزيجيه	طينية مزيجيه	
		(p H)
		التوصيل الكهربائي (EC) (ديسي سيمنز . -)
		المادة العضوية (O.M)
		النتروجين الكلي ppm
		الفسفور الجاهز ppm
		البوتاسيوم الجاهز ppm
		الكالسيوم الجاهز ppm

أجرى التحليل في مختبرات قسم التربة /كلية الزراعة /جامعة دهوك.

زرعت التقاوي المهيأة للزراعة وذات نبوتات بطول - سم والهولندية المنشأ ويرتبة E ٣/١ للموسمين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ على التوالي (وذلك لكثرة تساقط الأمطار في الموسم الأول والذي أدى إلى التأخير في موعد الزراعة بعشرة أيام عن الموعد المحدد للزراعة ٣/١) على مروز بطول ٣ م والمسافة بين المروز ٧٥ سم وفي الثلث العلوي من المروز وعلى عمق ١٥ سم تحت سطح التربة وبمسافة ٣٠ سم بين درنة وأخرى وفي ٤/١٣ و ٤/١ للموسمين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ على التوالي أضيف معلق البكتيريا *Azotobacter chroococcum* إلى منطقة الجذور وتم تنمية البكتيريا عبر تحضير الوسط الغذائي المسمى (Waksman No-97 broth) والخاص بعزل هذه البكتيريا والذي يتكون من (، غم فوسفات هيدروجين البوتاسيوم و ' ، غم كبريتات المغنيسيو ، المائية $Mg\ So_4.7H_2O$ و ٢ ، غم من كلوريد الصوديوم $NaCl$ ، غم كبريتات الحديد المائية $FeSO_4.7H_2O$ ، غم من كبريتات المنغنيز $MuSO_4$ غم من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ و ١٠ غم من المانيتول وقليل من ملح الموليبدنيم Trac Molybdenum Salt تم إذابة المواد في مل من الماء المقطر وبعدها وضعت في الاوتوكلاف في درجة حرارة م وضغط (Motsara) وبعد تبريد الوسط وضع اللقاح البكتيري النتروبيين والمنتج من قبل وزارة الزراعة / الهيئة العامة لصندوق الموازنة والزراعة / وتحت إشراف وحدات التسميد الحيوي بكليات الزراعة بجامعة القاهرة والفيوم وألينا وبواقع /

م ولفترة خمسة أيام (Benson) (Seinclair Dhingra) الخاليا البكتيرية في ١ مل من الوسط باستخدام شريحة عد الابواغ هيموسيتوميتر () كان عدد الخلايا البكتيرية 2×10^6 و 4×10^6 وللموسمين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ على الدرنات ب ١ مل من الوسط لكل نبات وبصورة متجانسة إذ خفف المحلول بإضافة لترين لكل مرز أي مل/نبات في ١٠/٤ و ٤/١ على التوالي. أما السماد النتروجيني (اليوريا) ٤٦% N فقد أضيف بثلاث مستويات صف و ١٠٠ و ٢٠٠ كغم/هكتار وكانت الإضافة على دفعتين الدفعة الأولى بعد الإنبات الحقل للدرنات وشملت نصف الكمية المثبتة لكل مستوى وأضيف النصف الآخر بعد أسبوعين من الدفعة الأولى، صممت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثلاثة مكررات وبواقع ١٢ معاملة عاملية (وحدة تجريبية) في كل مكرر وتكونت الوحدة التجريبية من أربعة مروز. أجريت جميع عمليات الخدمة الزراعية كما هو متبع في حقول البطاطا مع إجراء مكافحة وقائية لحشرة الذبابة البيضاء باستخدام Thiodan % / .

أخذت قياسات عن الحاصل والموسمين وشملت: ١- عدد الدرنات /نبات، تم حسابها بقسمة عدد الدرنات الناتجة في الوحدة التجريبية الواحدة على عدد النباتات التي أخذت منها الدرنات، ٢- معدل وزن الدرنات (غم)، تم احتسابها بقسمة وزن الحاصل في الوحدة التجريبية مع استبعاد الدرنات الصغيرة التي وزنها اقل من ٢٥ غم (Singh و Grewall، ١٩٧٩)، ٣- معدل حاصل النبات الواحد (غم)، تم احتسابه حسب المعادلة التالية

وزن الحاصل في الوحدة التجريبية

=

التي اخذ منها الحاصل

(/هكتار)، تم احتسابه حسب المعادلة التالية

-

حاصل الوحدة التجريبية

=

مساحة الوحدة التجريبية

باعتبار مساحة الدونم الفعلية =

- النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرنات (%)، تم اختيار عينات الدرنات بصورة عشوائية من كل وحدة تجريبية ولجميع المكررات، تم اخذ منها غم وجففت في فرن كهربائي على درجة حرارة ٧٥ درجة مئوية ولمدة ساعة ولحين ثبات الوزن ثم وزنت وتم حساب النسبة المئوية للمادة الجافة،

- محتوى الدرنات من العناصر الغذائية (النتروجين، الفسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم) قدر النتروجين باستخدام مايكروكلدال وفق طريقة Black (١٩٦٥) والفسفور باستخدام جهاز الطيف الضوئي John Spectrophotometer (١٩) والبوتاسيوم بواسطة جهاز قياس Flame photometer حسب الطريقة التي وردت في AOAC () والكالسيوم بطريقة التسحيح مع الفرمسينت EDTA وحسب الطريقة التي أوردها Page ().

- نسبة البروتين في الدرنات: وتم الحصول على هذه النسبة من القانون التالي

نسبة البروتين = النسبة المئوية للنتروجين $\times$ (Rastovski) .

تم التحليل الإحصائي للناتج بواسطة الحاسوب باستخدام نظام (SAS) (SAS) واعتمد اختبار دنكن المتعدد الحدود لاختبار معنوية المتوسطات عند مستوى احتمال % ().

النتائج والمناقشة

يوضح () تأثير التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر ومع مستويات مختلفة من سماد اليوريا في صفات الحاصل الكمية (الدرنات، وزن الدرنه، حاصل النبات الواحد (غم)، الإنتاج الكلي طن/هكتار ويظهر من الجدول بان معاملة التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر أدت إلى زيادة في صفات الحاصل الكمية وكانت الزيادة معنوية في كل من صفة حاصل النبات الواحد والإنتاج الكلي لوحدة المساحة وأعطت معاملة التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر إلى زيادة في % للموسمين الأول والثاني على التوالي

مقارنة مع معاملة عدم التلقيح ببكتريا ، وكذلك أحدثت معاملات إضافة الأسمدة المعدنية وبالمستويين ١٠٠ و ٢٠٠ كغم/هكتار إلى زيادة معنوية في بعض الصفات المدروسة للحصول وكانت الزيادة تزداد مع زيادة المستوى المضاف من السماد المعدني (اليوريا) ، وكانت اعلى قيم لصفات الحاصل (١٢ ، ٠٢ ، ٧ ، ٤٤) و (٣٨ ، ٩٩ غم ، ٦٠ ، ٧٦ غم) و (٣٩ ، ٧٣٩ غم ، ٧٣ ، ٩٢٠ غم) و (٥٨ ، ٢٨ ، ٠٠ ، ٣٦ طن/هكتار) لكل من صفة عدد الدرنات /نبات ، معدل وزن الدرنه غم ، وحاصل النبات الواحد غم ، والإنتاج الكلي لوحدة المساحة طن/هكتار على التوالي وللموسمين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ على التوالي ، كذلك يظهر من الجدول تأثير معاملات التداخل الثنائي بين التلقيح البكتيري ومستويات السماد المعدني (اليوريا) فقد أحدثت فروقات معنوية في صفات الحاصل الكمية باختلاف معاملات التداخل الثنائية وقد تميزت معاملة التداخل الثنائي بين التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر والمستوى /هكتار من السماد المعدني في إنتاج أع

التوالي بالمقارنة مع معاملة عدم التلقيح بيكتريا الازوتوباكتر ومع عدم إضافة السماد المعدني اليوريا والتي أعطت أقل القيم في الصفات أعلاها .

يوضح الجدول () تأثير التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر ومستويات السماد المعدني (اليوريا) في الصفات النوعية للحاصل (النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرنات ، ومحتوى الدرنات من العناصر الغذائية N,P,K,Ca و النسبة المئوية للبروتين في الدرنات) ، وتظهر من بيانات الجدول أن معاملة التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر أدت إلى زيادة في الصفات النوعية للدرنات ولموسمي الدراسة وكانت الزيادة معنوية لكل من النسبة المئوية للبوتاسيوم ولكلا الموسمين وكذلك النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرنات والنسبة المئوية للنتروجين والنسبة المئوية للبروتين وللموسم الثاني فقط ، كذلك أدت معاملات إضافة الأسمدة المعدنية وبالمستويين ١٠٠ و ٢٠٠ كغم/هكتار إلى زيادة في الصفات النوعية للدرنات وخاصة معاملة المستوى ٢٠٠ كغم/هكتار والتي أعطت أعلى القيم (١٥,٦٠, ٦٢, ١٩%) و (١,٩٢, ٣١, ١) و (٣٤١, ٣٦٢, ٠, ٠%) و (١,٩٩, ٧٦, ٢%) و (١,٣٩, ٣٩, ١%) و (٤,٦٣, ٨١, ٩%) لكل من صفة النسبة المئوية للمادة الجافة في الدرنات ومحتوى الدرنات من العناصر الغذائية (النتروجين) و (الفوسفور) و (البوتاسيوم) و (الكالسيوم) وكذلك نسبة البروتين في الدرنات على التوالي وللموسمين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ على التوالي . وكذلك يوضح الجدول (٣) تأثير معاملات التداخل الثنائي بين بكتريا الازوتوباكتر ومستويات السماد المعدني يوريا في الصفات النوعية للدرنات وكان لمعاملة التداخل الثنائي بين التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر والتسميد المعدني وبالمستوى ٢٠٠ كغم/هكتار تأثير معنوي في زيادة جميع الصفات النوعية للدرنات وكانت أعلى قيم للنسبة المئوية للمادة الجافة (١٥,٧٥ و ١٢,٢٠) وللموسمين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ على التوالي ، أما أعلى نسبة مئوية للبروتين فكانت (١٥,٥٩ و ١٠,٨٥) للموسمين ٢٠٠٥ و على التوالي مقارنة بمعاملة التداخل الثنائي بين عدم التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر وعدم إضافة السم النتروجيني والتي أعطت أقل القيم لجميع الصفات النوعية للدرنات والمثبتة في () .

زيادة التي حصلت في الحاصل الكمي (عدد الدرنات ، وزن الدرنات) وحاصل النبات الواحد وإنتاجية وحدة المساحة وكذلك الصفات النوعية للدرنات نتيجة لمعاملة التلقيح ببكتريا الازوتوباكتر ترجع إلى دور البكتريا في التحسن الذي حدث في صفات النمو الخضري (الجزء الأول من البحث (سرحان ٢٠٠٨) وبالتالي انعكس التحسن في صفات النمو الخضري إلى الزيادة في صفات الحاصل الكمية وتتنفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من (Sidorenko و آخرون، ١٩٩٦ و EL-Gamal ١٩٩٦) من أن تلقيح البطاطا بالسماد الحيوي Halex-2 والحاوي على بكتريا الازوتوباكتر أدى إلى الزيادة في صفات الحاصل الكمية والنوعية للدرنات وقد أوعزوا ذلك إلى قدرة البكتريا المثبتة للنترجين في تجهيز عنصر النتروجين ، (الفوسفور ، البوتاسيوم ، الكالسيوم) وهذا ما مثبت في جدول (٣) فضلا عن دور بكتريا الازوتوباكتر إلى تحسين إنتاج الهرمونات النباتية مثل الاوكسينات والجبرلينات) (فضلا عن

الفيتامينات البايوتية وحامض الفوليك ومجاميع فيتامين (B) Vivek kumar آخر

Tartoura

THE EFFECT OF INOCULATION WITH AZOTOBACTER BACTERIA AND DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN FERTILIZER ON 2- PRODUCTION OF POTATO PLANT (*Solanum tuberosum* L.)

Khalida omar
Hort. Dept. College of Agric. and Forestry
Univ. of Mosul

Taha Z. Sarhan
Hort. Dept. College of Agric
Univ. of Dohouk

ABSTRACT

The study was conducted at Research Field /Agriculture Research Station ,Zakho, North of Iraq during 2005 and 2006 growing seasons to investigate the effect of inoculation with *Azotobacter chroococcum* (+ , -) and varying levels of nitrogen fertilizer Urea 46% N (0, 100, 200 kg/hectar) on quality yield of potato plant *Solanum tuberosum* L. cv. Desiree , a factorial randomized complete design (F-RCBD) was selected for the experiment with three replicates . The results showed that there was significant increase in the quality characteristic of yield (number of tuber /plant , weight of tuber (gm.), total yield /plant (gm.), and the productivity of unit area) , and the percentage of dry matter in tubers , and the percentage of mineral nutrition in tuber (N, P, K, Ca) and the percentage of protein. As a result of treating inoculation with Azotobacter bacteria , and for the treatment of adding nitrogen fertilizer especially the level 200 kg/hectar and for the two growing seasons 2005 and 2006 . The result of interaction treatment between the inoculation with Azotobacter bacteria and the nitrogen fertilizer 200 kg/hectar showed that there was significant increasing in the tuber number/plant , weight of tuber (gm.), yield /plant (gm.), and productivity of unit area (t/hectar) , where the results were (7.45 , 100.67 gm./tuber , 749.99 gm/plant , 29.32 T./hac. respectively for the first growing season, and (12.19 , 68.30 gm/tuber , 954.48 gm/plant , 37.32 T./hectar) For the second season. Also the interaction treatments between inoculation with Azotobacter and adding 200 kg/hectar urea lead to a significant increasing in dry matter and percentage of (N, P, K, Ca) and protein in tuber for the two growing seasons of 2005 and 2006.

المصادر

الدورة التدريبية القومية حول إنتاج واستخدام المخصبات الحيوية . () . عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية ، جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، - أيار .
() . الدار العربية لنشر والتوزيع . القاهرة . جمهورية مصر العربية .
د العزيز محمود خلف الله . () . يم وتحليل التجارب الزراعية)
الموصل ، جمهورية العراق .
الثنائية)
سرحان ، طه زبير () . تأثير الحبيوة والمخلفات الحيوانية واليوريا في نمو وحاصل نبات ا
صنف ديزيري . دكتوراه ، كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، جمهورية العراق .
المجموعة الإحصائية العراقية السنوية . () . الجهاز المركزي للإحصاء ، وزارة التخطيط ، جمهورية

Benson, H.J.(1979).Microbiological application a laboratory manual in general microbiology 3 ed.P.153 .

Dhingra, O. D and J.B. Seinclair ,(1987). Basic plant pathology methods Univ . of Illinois , CRC press, Inc . Boca Raton , Florida . 355 pp .

El-Gamal A.M.(1996). Response of potato in newly reclaimed areas to mineral nitrogen fertilizer levels and nitrogen fixing biofertilizer Halex2. Assiut J. of Agric. Sci. 27(2):89-99.

FAO (1997).Production year book.F.A.O.Rome,Italy,Vol.51:22-26.

- FAO (2006).Status of Research and Application of crop biotechnologies in developing countries. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2006.
- Forlain,G.M.;M.Branzoni;R.Pastorelli and S.Sarvilli.(1995).Root potentially related properties in plant associated bacteria.J.of General breeding Italy 49(4): 343-352.
- Haller,T.,and H.Stople.(1985).Quantitative estimation of root exudation of maize. Plant Soil,86:207-216.
- Motsara,M.R.;P.Bhattacharyya and B.Srivastava.(1995).Biofertilizer ,Technology,Marketing and Usage.Fertilizer development and Consultation Organisation ,New Delhi,India.
- NIVAA(1994).Netherland catalogue of potato varieties .NIVAA,The hague.CPRO-DLO,Wageningen.Holland .
- Rastovski, A. and Es. *et al.*, Van (1987). Storage of potatoes postharvest behaviour,store design, storage practice handling .prdoc. Wegeningen .pub.
- SAS,(1996).Statistical analysis system .SAS Instiute.Inc. Cary Nc. 27511,USA.
- Shafeek,M.R.,Fatin S.,Abdel-al,and Aisha,H.Ali.(2004).The productivity of broad bean plant as affected by chemical and /or natural phosphorus with different biofertilizer.J.Agric.Sci.Mansoura Univ.29(5):2727-2740.
- Sidorenko,O.,V.Storozhenko and O.Kokharenkova.(1996).The use of bacterial preparation in potato cultivation .Mezhdunarodngi.Sel: Skokhozyaistvenny: Zhurnal.1996, No.6.36-38 (C.F. International network).
- Singh, S. N. and J. S. Grewall (1979). Prymatter production and NPK uptake by potato variety Kufri chondra munki (*Solanum tuberosum* L.) in Alluvial soil JIPA 6(2)78-86.
- Tartoura,E.A.A.(2001).Response of pea plant to yeast extract and two source of N-fertilizers .J.Agric .Sci.Mansoura Univ.,26(12):7887-7901.
- Vivek Kumar,R.C.; Jaiswal, and A.P Singh.(2001).Effect of bio fertilizer on growth and yield of potato. J.Indian Potato Assoc.28 (1):60-61(2001).